

controlar la alta temperatura ambiente. El otro adulto estaba a 4-5 m del nido, a la sombra de un árbol joven de Mango.

La literatura no consigna información de otros avistamientos más al sur de los valles de Lluta y Azapa, por lo que esta podría ser una expansión preliminar de la especie hacia el sur, lo que además amplía unos 30 km el rango reproductivo de esta especie en Chile.

LITERATURA CITADA

- ARAYA, B. & G. MILLIE. 1996. Guía de Campo de las Aves de Chile. Séptima edición. Editorial Universitaria, Santiago.
- DROUILLY, P., J. ROTTMANN & R. P. SCHLATTER 1972. Hallazgo de una especie de ave visitante en Arica. Boletín Ornitológico 4: 13.
- HOWELL, S & S. WEBB. 1995. Noteworthy bird observations from Chile. Bulletin of the British Ornithologists' Club 115: 57-66.
- MARÍN, M. 2004. Lista Comentada de las Aves de Chile. Ediciones Lynx, Barcelona.
- MARTÍNEZ, D. & D. GONZÁLEZ. 2004. Las Aves de Chile, Nueva Guía de Campo. Ediciones del Naturalista, Santiago.
- SALLABERRY, M., J. AGUIRRE & J. YAÑEZ. 1992. Adiciones a la lista de Aves de Chile: descripción de especies nuevas para el país y otros datos ornitológicos. Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 321: 3-10.

Boletín Chileno de Ornitología 12: 37-39
Unión de Ornitólogos de Chile 2006

NUEVOS REGISTROS DEL GAVIOTÍN DE SANDWICH (*STERNA SANDVICENSIS*) LATHAM, 1787 EN CHILE CENTRAL New records on the Sandwich Tern (*Sterna sandvicensis*) Latham, 1787 in central Chile

JUAN AGUIRRE

AvesChile, Mosquito 459, Oficina 103, Santiago

E-mail: jeac616@gmail.com

ABSTRACT.- I report new sightings of Sandwich terns (*Sterna sandvicensis*) at two localities in central Chile; four records at the mouth of the Cartagena marsh (33°31'S) between 1996 and 2004 and two records at the mouth of Maipo river (33°36'S) in 2005. These and other published reports suggest that Sandwich terns are seen in Chile between Arica (18°S) and the mouth of Maipo river mainly between November and May, occurring in small flocks (up to four individuals) and mixed with other tern and gull species.

El gaviotín de Sandwich (*Sterna sandvicensis*) se reproduce en Norte América y Eurasia y una parte de su población migra hacia Sudamérica por la costa pacífica con registros hasta el sur de Perú (Harrison 1983,

Hughes 1988) y hasta la región del BíoBío en Chile central (Martínez & González 2004). Otra parte de su población migra por la vertiente atlántica hasta la provincia de Santa Cruz en Argentina (De la Peña 1999). En la presente

nota se comunican seis nuevos registros y se resumen algunas observaciones publicadas sobre la misma especie.

En la desembocadura del estero Cartagena (33° 31' S) ubicada en la provincia de San Antonio, región de Valparaíso, se han registrado los siguientes ejemplares de gaviotín de Sandwich:

1.- 21 de abril de 1996, un ejemplar descansando en las dunas junto a una decena de gaviotines elegantes (*Sterna elegans*) y dos centenares de gaviotas de Franklin (*Larus pipixcan*).

2.- 3 de marzo de 2002, un ejemplar descansando en las dunas junto a una banda mixta de una treintena de gaviotines elegantes y un centenar de gaviotas de Franklin.

3.- 4 de mayo de 2003, dos individuos descansando en las dunas en compañía de un gaviotín boreal (*Sterna hirundo*), además de varias decenas de gaviotas garumas (*Larus modestus*), gaviotas cáhuil (*Larus maculipennis*) y gaviotas dominicanas (*Larus dominicanus*).

4.- 19 de diciembre de 2004 dos individuos descansando en las dunas en compañía de una treintena de gaviotas de Franklin, 12 gaviotines elegantes y tres gaviotines boreales.

En la desembocadura del río Maipo (33° 36' S) ubicada en la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso, se han registrado los siguientes de ejemplares de gaviotín de Sandwich:

1.- 26 de enero de 2005, un individuo descansando en las dunas en una bandada mixta con doscientas gaviotas de Franklin, una treintena de gaviotines elegantes, una decena de gaviotines boreales y una treintena de gaviotas cáhuil.

2.- 09 de febrero de 2005, un individuo descansando en las dunas en compañía de un centenar de gaviotas de Franklin, una treintena de gaviotines elegantes y 14 gaviotines boreales.

Los registros publicados a la fecha de esta especie se resumen en la tabla 1. Además de los citados en la tabla 1, se conocen regis-



Figura 1.- Gaviotín de Sandwich (segundo de izquierda a derecha) en compañía de un gaviotín elegante y gaviotas de Franklin en la desembocadura del río Maipo, febrero de 2005. Fotografía: Juan Aguirre.

Tabla 1.- Resumen de los registros de gaviotín de Sándwich en Chile, ordenados por meses.

Mes	Año	Individuos	Lugar	Latitud	Autor
Noviembre	1992	varios	Iquique	20° S	Peredo & Amado (1995)
Diciembre	2004	2	Cartagena	33° S	Este trabajo
Diciembre	2005	1	Arica	18° S	Peredo *
Enero	2005	1	Río Maipo	33° S	Este trabajo
Febrero	2005	1	Río Maipo	33° S	Este trabajo
Marzo	1985	?	Tongoy	30° S	Schlatter (1992)
Marzo	2002	1	Cartagena	33° S	Este trabajo
Abril	1973	1	Arica	18° S	McFarlane (1974)
Abril	1996	1	Cartagena	33° S	Este trabajo
Abril	2001	3	Río Maipo	33° S	Marín (2002)
Abril	2002	4	Río Maipo	33° S	Marín (2002)
Mayo	2003	2	Río Maipo	33° S	Este trabajo

*Dato publicado en la sitio web www.aveschile.cl

tros de individuos del gaviotín de Sandwich sin fecha en la Península de Tumbes, provincia de Concepción (Araya & Millie 1996) y en los años 2002 y 2003 en Tongoy y Santo Domingo (Martínez & González 2005)

De los datos anteriores podemos interpretar que el gaviotín de Sandwich visita las costas de Chile, entre Arica (18° S) y la desembocadura del río Maipo (33° S) entre los meses de noviembre y mayo, se lo ha registrado como individuos solitarios o pequeños grupos que no exceden los 4 ejemplares y habitualmente se ve asociado a otros gaviotines o gaviotas descansando en zona de dunas costeras.

AGRADECIMIENTOS.- Se agradece a dos correctores anónimos que con sus indicaciones mejoraron claramente esta nota.

LITERATURA CITADA

- ARAYA, B. & G. MILLIE. 1996. Guía de campo de las Aves de Chile. Séptima edición. Editorial Universitaria, Santiago.
- DE LA PEÑA, M. 1999. Guía de Aves Argentinas. Literature of Latin America, Buenos Aires.
- HARRISON, P. 1983. Seabirds, an identification guide. Helm Ltd, Kent – Australia.
- HUGHES, R. A. 1988. Nearctic migrants in southwest Perú. Bulletin of the British Ornithologists' Club 108: 29-43.
- MARÍN, M. 2002. Nuevos avistamientos de gaviotín de Sandwich (*Sterna sandvicensis*) en la zona central de Chile. Boletín Chileno de Ornitología 9: 26-28.
- MARTÍNEZ, D. & G. GONZÁLEZ. 2005. Las Aves de Chile, nueva guía de campo. Ediciones del Naturalista, Santiago.
- MCFARLANE, R. W. 1974. Unusual avian migrant in Tarapacá. Idesia 3: 181-184
- PEREDO, R. & N. AMADO. 1995. Observación de gaviotín de Sandwich en Iquique. Boletín Chileno de Ornitología 2: 29.
- SCHLATTER, R. P. 1992. Observaciones de aves en el Norte Chico, Boletín Informativo UNORCH 13: 7-8.