

Este avistamiento era uno de los más septentrionales de que se tenía registro para la costa occidental de América del Sur, pero en el verano de 1994 fueron observados tres ejemplares de esta especie en la IV Región (Tabilo *et al.* 1996).

La presencia de un individuo es sólo una casualidad y debe tratarse de un avistamiento de un ave errante que puede haber extraviado su ruta por condiciones climáticas adversas o simplemente por falta de experiencia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta algún tipo de factores que pueda estar afectando a esta y a otras aves marinas, considerando además, que Bingham (1996) reporta una notable disminución del número de nidos de la subespecie de este pingüino en las Islas Falklands.

LITERATURA CITADA

- ARAYA, B., G. MILLIE Y M. BERANL. 1986. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria, Santiago.
- ARAYA, B., M. BERNAL, R. SCHLATTER Y M. SALLABERRY. 1995. Lista Patrón de las Aves Chilenas. Ed. Universitaria, Santiago.
- BINGHAM, M. 1996. Censo de Pingüinos en Islas Falklands 1995/96. Falklands Conservation Reports.
- HARRISON, P. 1983. Sea birds, an identification guide. Houghton Mifflin Company, Boston.
- TABILO, E., R. JORGE Y J. CAMPUSANO. 1996. Nuevas observaciones sobre la Ornitofauna de las regiones de Atacama y Coquimbo. Boletín Chileno de Ornitología 3: 34-36.
- VENEGAS, C. 1984. Estado de las poblaciones de pingüino de penacho amarillo y macaroni en la isla Noir. Informe N° 33, Instituto de la Patagonia., Punta Arenas, Chile.
- VENEGAS, C. 1991 Estudio de cuantificación poblacional de pingüinos crestados en isla Recalada. Informe N° 55, Instituto de la Patagonia, Punta Arenas, Chile.
- VENEGAS, C. 1994. Aves de Magallanes. Ediciones de la Universidad de Magallanes, Punta Arenas.

Boletín Chileno de Ornitología 4: 37 - 39
Unión de Ornítólogos de Chile 1997

REGISTRO DE ANIDACION DE *Eremobius phoenicurus*, BANDURRILLA DE COLA NEGRA (*FURNARIIDAE*), EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

RICARDO MATUS¹ y BENITO GONZÁLEZ P.^{1,2}

¹Unión de Ornítólogos de Chile, casilla 572-11, Santiago

²Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía y Forestal, Vicuña Mackenna 4860, Santiago

La Región de Magallanes cuenta con un total de 209 especies de aves registradas, de las cuales 55 son Passeriformes; quince especies, pertenecientes a la familia Furnariidae, se encuentran en la región y están clasificadas como Residentes (Venegas 1986, Araya *et al.* 1995). *Eremobius phoenicurus*, bandurrilla de cola negra, posee una amplia distribución en la Patagonia argentina y su categoría en Chile es Accidental, debido a la colecta de un espécimen en 1988 (Vuilleumier *et al.* 1993) y la observación de dos individuos en 1994 (Howell y Webb 1995), ambas en O'Higgins, XII región.

El objetivo de este trabajo es entregar información sobre la presencia y anidación de *Eremobius phoenicurus* en la región de Magallanes, Chile.

Durante una prospección realizada el 15 de agosto de 1996 a un ambiente de matorral y estepa (52° 27' S, 69° 48' W), dominado por mata verde (*Lepidophyllum cupressiformes*) y coirón (*Festuca gracillima*), comuna de San Gregorio, se registró la presencia de 2 aves no comunes para la región (Araya *et al.* 1986). Se observaron con binoculares 8 x 54 y se tomaron 4 fotografías con lente de

38 CONTRIBUCIONES BREVES

300 mm para su posterior determinación (originales y copias con el autor y coautor respectivamente). El sector se visitó nuevamente los días 28 de septiembre, 18 de octubre y 24 de noviembre.

De acuerdo a las características morfológicas y a su coloración, las aves se identificaron como *Eremobius phoenicurus* (Johnson 1967, De La Peña 1988, com. pers., Narosky y Yzurieta 1987, Ridgely y Tudor 1989, Vuilleumier *et al.* 1993.). Los individuos, al parecer una pareja, no presentan dimorfismo sexual, caracterizándose por: (1) la cola de color rojizo en la porción proximal, que contrasta fuertemente con el negro de la porción distal, y (2) línea superciliar blanca.

Las aves presentaban un comportamiento similar a *Cinclodes*, ya que al proclamar su territorio desde la punta del matorral, trina y abre las alas del mismo modo que *C. fuscus* y *C. patagonicus*. Emitían un canto similar al descrito por De La Peña (1988), Ridgely y Tudor (1989) y Narosky y Yzurieta (1993) para *E. phoenicurus*. Las aves fueron observadas alimentándose en el suelo, donde se desplaza con gran rapidez y con la cola levantada, lo que concuerda con otras descripciones (Ridgely y Tudor 1989). Al observar que acarreaban material hacia un lugar determinado, se constató la fabricación de un nido en el interior del matorral.

Durante la segunda visita (finales de septiembre) no se observaron a las aves en el sector, pero el nido mostraba signos externos de haber sido usado.

En la tercera visita (mediados de octubre) se procedió a hacer una caracterización del nido, el cual era de tipo cerrado (diapositivas con el autor y coautor). Este se encontraba en una mata aislada de *Lepidophyllum cupressiformes*, a 85 cm del suelo en una bifurcación de ramas. La ubicación era en la porción Norte del arbusto, pero la entrada al nido se dirigía hacia el Oeste. La dimensiones externas son: 23 cm de alto, 18 cm de ancho, y 20 cm de largo. La entrada a la bóveda se encontraba a 8 cm de la parte superior y tenía un diámetro de 4 cm. La cámara era de 6 cm de diámetro ubicada en la parte baja de la estructura, con una distancia entre la entrada y el fondo de 13 cm. El material principal era coirón tejido (*Festuca gracillima*) y material suave en la entrada y el interior (lana y plumas), concordando con lo descrito por De La Peña (1988) para el nido de la especie. Se encontró un huevo abandonado dentro de la cavidad, su color es blanco y sus medidas 24,5 x 19 mm. Las medidas de los huevos de *E. phoenicurus*, de acuerdo a De La Peña (1988), son: 22-26 x 16,5-17,5 mm.

En la cuarta visita (fines de noviembre), se encontró a 4 polluelos emplumando en el mismo nido, lo que indicaría una segunda anidación.

La bandurrilla de cola negra es una especie de amplia distribución en la Patagonia Argentina, llegando hasta Río Negro y Santa Cruz (De La Peña 1988). Existen registros que datan desde 1940 en las inmediaciones de Chile (Olrog 1948, citado por Johnson 1967), siendo confirmada su presencia en Magallanes por Vuilleumier *et al.* (1993) en el sector de O'Higgins. Howell y Webb (1995), durante su expedición en Noviembre de 1994, encontraron una pareja cerca de Punta Delgada, posiblemente alimentando polluelos.

Se estima que para la presente observación, la nidificación se realizó entre agosto y septiembre para la primera puesta, y en noviembre para la segunda postura. La temprana reproducción de esta especie podría estar influenciada por las condiciones ambientales favorables del invierno de 1996 (INIA 1997).

Este sería el tercer registro de *Eremobius phoenicurus* en Chile; estableciendo además, su reproducción en el territorio nacional, siendo el más austral dentro de su área de distribución. Se cuestiona la clasificación Accidental para la especie sobre la base de la información entregada.

Los autores desean agradecer la valiosa cooperación de Martín De La Peña, en la identificación de la especie; a Iván Lazo, Yerko Vilina, Juan Carlos Torres-Mura, Michel Sallaberry y Hans Rohers por el apoyo brindado.

LITERATURA CITADA

ARAYA, B., G. MILLIE Y M. BERNAL. 1986. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria, Santiago.

- ARAYA, B., M. BERNAL, R. SCHLATTER Y M. SALLABERRY. 1995. Lista patrón de las aves de Chile. Ed. Universitaria, Santiago, 35 pp.
- DE LA PEÑA, M. 1988. Guía de aves Argentinas. Tomo V: Passeriformes. Ed. L.O.L.A. Argentina.
- HOWELL, S.N.G Y WEBB, S. 1995. Noteworthy bird observations from Chile. Bulletin of the British Ornithological Club 115 (1): 57-66.
- INIA. 1997. Registro Agroclimatológico de la Estación Experimental CRI-Kampenaiké.
- JOHNSON, A.W. 1967. The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Perú. Platt Establecimientos Gráficos S.A.. Buenos Aires.
- NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentinas y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
- OLROG, C.C. 1948. Observaciones sobre la avifauna de Tierra del Fuego y Chile. Acta Zool. Lilloana 5: 437-531, citado por Johnson, A.W. 1967. The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Perú. Platt Establecimientos Gráficos S.A.. Buenos Aires.
- RIDGELY, R. Y G. TUDOR. 1989. The birds of South America. Vol. II. Oxford University Press. Oxford.
- VENEGAS, C. 1986. Aves de patagonia y Tierra del Fuego chileno-argentina. Ediciones de la Universidad de Magallanes. Punta Arenas, Chile.
- VUILLEUMIER, F., A. CAPPARELLA E I. LAZO. 1993. Two notable records from chilean patagonia. Bulletin of the British Ornithological Club 113: 85-87.

Boletín Chileno de Ornitología 4: 39 - 40
Unión de Ornitólogos de Chile 1997

**NUEVA OBSERVACION DEL PAJARO AMARILLO *Pseudocolopteryx flaviventris*,
(PASSERIFORMES: TYRANNIDAE) EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO MAIPO,
REGION DE VALPARAISO, CHILE**

JUAN AGUIRRE C.

Unión de Ornitólogos de Chile. Casilla 572-11, Santiago.

El pájaro amarillo, *Pseudocolopteryx flaviventris* (D'Orb & Lafr. 1837), se distribuye en Sudamérica desde el sur de Brasil, este de Bolivia, Uruguay y Paraguay, hasta la provincia del Chubut en el sur Argentino (Meyer de Schauensee 1982, Fjeldsá y Krabbe 1990). En Chile se encontraría entre Antofagasta y Valdivia (Araya *et al.* 1986).

Los registros conocidos en los últimos años son sólo de la región Metropolitana: Quilicura (Johow y Johow 1990), Batuco (García y Vilina 1994) y Lampa (M. Sallaberry 1995, com. pers.).

El día 21 de diciembre de 1996 en una visita de trabajo, matinal y rutinaria, para la toma de datos de la avifauna de la desembocadura del Río Maipo, se pudo observar por un prolongado período dos ejemplares adultos de este escaso pajarillo. Durante la observación se los vió alimentarse de pequeños insectos voladores, que cogían en cortos y bajos vuelos en medio de la vegetación, también se los observó en vuelos de persecución y ocultamiento en la vegetación, que podrían ser despliegues nupciales, en muy escasas ocasiones se escucharon débiles y cortas vocalizaciones y en dos ocasiones se mostraron aperchados en lo alto de cañas del totoral para prontamente ocultarse en la vegetación por largos períodos. Durante el transcurso del mes de enero de 1997 se realizaron dos visitas al sector, y sólo en una de ellas fue detectado un ejemplar, hay que hacer presente que la zona durante este mes estuvo completamente inundada lo que dificultó un monitoreo más profundo para tratar de verificar su posible nidificación. En la visita realizada el 2 de febrero nuevamente se encontró un ejemplar solitario y este fue el último registro en la zona. En la segunda quincena de febrero y en las dos visitas de marzo no fueron detectados.