

pichones fue observado entre el 24 de diciembre de 1995 y el 23 de enero de 1996, tres de los cuales salieron volando del mismo lugar el 13 de febrero. En los alrededores se observaron además, dos patos jergón grande (*Anas georgica*) y un huairavo juvenil (*Nycticorax nycticorax*).

El sitio de nidificación era frecuentemente visitado por bañistas, recolectores de leña, liceanos faltantes a clases, así como también por perros. La laguna se encuentra en el borde de un camino del fundo, por el cual transitan tractores y otros vehículos. Además, en diciembre se cortó el pasto del potrero vecino, causando gran estruendo. Sin embargo, esta pareja de patos jergones chicos (o las parejas, porque no hay evidencia que hayan sido los mismos) logró criar y llevar hasta estado de volantones las dos nidadas de pichones, lo que muestra la adaptabilidad de esta especie.

#### LITERATURA CITADA

- BLANCO, D. Y P. CANEVARI. (compiladores) 1993. Censo Neotropical de Aves Acuáticas 1992. Humedales para las Américas. Buenos Aires.
- BLANCO, D. Y P. CANEVARI. (compiladores) 1994. Censo Neotropical de Aves Acuáticas 1993. Humedales para las Américas. Buenos Aires.
- BLANCO, D. Y P. CANEVARI. (compiladores) 1995. Censo Neotropical de Aves Acuáticas 1994. Humedales para las Américas. Buenos Aires.
- FJELDSA, J. Y N. KRABBE. 1990. The birds of high Andes. Ed. Apollo Books, Svendborg, Dinamarca.
- JOHNSON, A.W. 1965. The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru. Platt Establecimientos Gráficos S.A. Buenos Aires.
- MADGE, S. Y H. BURN. 1988. Wassvrgefluegel, Eim Bestimmungsbuch der Schwaene, Gaense und Enten der Welt. Ed. Verlag Paul Parey. Hamburgo.

*Boletín Chileno de Ornitología* 3: 39 - 40  
Unión de Ornitólogos de Chile 1996

### OBSERVACION DE GOLONDRINA NEGRA (*Progne modesta*) EN LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA

JADILLE MUSSA C.<sup>1</sup> Y CHARIF TALA G.<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Unión de Ornitólogos de Chile, Casilla 572-11, Santiago.  
<sup>2</sup> Servicio Agrícola y Ganadero, Avda. Bulnes 140, Santiago.

La golondrina negra (*Progne modesta*, Gould 1837), con tres subespecies descritas, se distribuye exclusivamente en Sudamérica formando poblaciones aisladas entre sí (Fjeldsa y Krabbe, 1990). La subespecie *P. m. elegans*, la más abundante de las tres, habita la vertiente oriental de los Andes, entre el norte de Brasil y Sur de Argentina (Fjeldsa y Krabbe, 1990; Narosky e Yzurieta, 1987). *P. m. murphy*, se distribuye a lo largo de la costa de Perú, alcanzando ocasionalmente las cercanías de Arica (Fjeldsa y Krabbe, 1990; Araya y Chester, 1993). La tercera subespecie, y la más escasa de todas, *P. m. modesta*, habita exclusivamente las Islas Galápagos.

Para Chile, la especie ha sido registrada sólo accidentalmente en las regiones primera y Metropolitana: cercanías de Arica (Araya y Chester, 1993), fuerte Baquedano en la Provincia de Iquique (González, 1988), Salar de Surire (Y. Vilina, comunicación personal) y Región Metropolitana (Araya y Chester, 1993). Las aves observadas corresponderían a *P. m. elegans* para la Región Metropolitana y *P. m. murphy* para el extremo norte del país (Araya y Chester, 1993).

A través de la presente nota se reporta el avistamiento de un ejemplar solitario de golondrina negra en las inmediaciones del cementerio de la ciudad de Mejillones, Provincia de Antofagasta. De acuerdo

al sitio de la observación, podría pensarse que el ejemplar avistado correspondería a la subespecie *P. m. murphy*. El ejemplar fue observado a las 11 hrs. del día 20 de febrero de 1996 y, la coloración general café grisácea indicaría que se trataba de un ejemplar juvenil o de una hembra.

#### LITERATURA CITADA

- ARAYA, B. Y S. CHESTER. 1993. The birds of Chile. Latour, Santiago.
- FJELDSA, J. Y N. KRABBE. 1990. The birds of high Andes. Ed. Apollo Books, Svendborg, Dinamarca.
- GONZÁLEZ, C. 1988. Una rica avifauna en el desierto transformado por el hombre. Boletín Informativo UNORCH 5: 14-26.
- GOODALL, J.D.; A.W. JONHSON Y R.A. PHILIPPI. 1957. Las aves de Chile, Tomo 2. Platt Est. Gráficos S.A., Buenos Aires.
- NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 1989. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Vazquez Mazzini Editores. Buenos Aires.

*Boletín Chileno de Ornitología* 3: 40  
Unión de Ornitólogos de Chile 1996

### GOLONDRINA BARRANQUERA (*Riparia riparia*) EN CUCAO, CHILOE.

ANDREAS VON MEYER Y LUIS ESPINOSA.  
Unión de Ornitólogos de Chile, casilla 711, Puerto Montt.

El 8 de diciembre de 1995, durante un curso de ornitología para guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), organizado por la Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH) y el Instituto de Estudios Ecológicos de Chiloé (IEECH) en la localidad de Cucao, Isla Grande de Chiloé, observamos un ejemplar de esta especie en una laguna costera distante aproximadamente a dos kilómetros del centro de informaciones de CONAF.

Cuando no volaba, se posaba siempre en el mismo poste semisumergido en la laguna. El ejemplar estaba en compañía de varias decenas, tanto de *Tachycineta meyeri* (golondrina chilena) como de *Notiochelidon cyanoleuca* (golondrina de dorso negro), las golondrinas más comunes de nuestro país. Al parecer se trataba de un ejemplar adulto, pues no presentaba el característico plumaje moteado de los juveniles (Jonsson 1993).

Una especie similar, *Phaeoprogne tapera*, la golondrina parda grande, residente de Argentina y posible visitante en nuestro país (Gerry Clark, com. pers.) presenta plumaje parecido, pero es mucho mayor en tamaño.

La ocurrencia de *Riparia riparia* en Chile ha sido revizada recientemente por Aguirre (1992). También ha sido observada por uno de los autores en la localidad de Petrohué, provincia de Llanquihue. Este sería el tercer registro de la especie para la décima región.

#### LITERATURA CITADA

- JONSSON, L. 1993. Die Voegels Europas und des Mittelmeerraumes. Franckh Kosmos, Stuttgart.
- AGUIRRE, J. 1992. Las golondrinas de Chile. Boletín Informativo UNORCH, 14: 18 - 19.