

Establecimientos Gráficos. Buenos Aires.

MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1970. A guide to the birds of South America. Livingston Publishing Company. Wynnewood, Pennsylvania.

Boletín Chileno de Ornitología 1:27.
Unión de Ornitólogos de Chile 1994

NUEVO AVISTAMIENTO DE *Tyrannus melancholicus* (PASSERIFORMES: TYRANNIDAE) PARA CHILE EN CALETA CHIPANA 21° 48' LAT. S, PRIMERA REGION.

NELSON AMADO, RONNY PEREDO, JORGE HERREROS Y WALTER SIELFELD.

Grupo de Estudios Ornitológicos, Dpto. Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121 Iquique.

Tyrannus melancholicus es una especie de zonas templadas y tropicales, ampliamente distribuido en América del Sur y Central (Meyer de Schauensee 1970). Sin embargo, no habían antecedentes de su presencia en Chile, motivo por el cual no figura en la Lista Patrón de las Aves de Chile (Araya 1985), siendo el avistamiento realizado por Aguirre y Egli (1993) en la laguna de Batuco, el primer registro de la especie para el país.

La presente nota informa de un nuevo avistamiento realizado el 10 de abril de 1993 en Caleta Chipana, localidad ubicada aproximadamente 150 km al sur de Iquique.

El espécimen observado presentaba coloración amarillo intenso en las partes inferiores y notablemente contrastante con el dorso verde oliva y la cabeza celeste grisáceo; de tamaño algo menor que el zorzal y pico fuerte y de color negro.

Las fotografías obtenidas y las características señaladas, concuerdan plenamente con las descripciones indicadas, entre otros, por Canevari et al. (1991) para *Tyrannus melancholicus*.

Las dos citas chilenas de *T. melancholicus*, parecen indicar una reciente inmigración de esta especie al territorio chileno, probablemente relacionada con trastornos climáticos como "El Niño".

LITERATURA CITADA.

ARAYA, B. 1985. Lista patrón de las aves chilenas. 2ª edición. Publ. Ocas. Instituto de Oceanología, Univ. de Valparaíso.

ARAYA, B., G. MILLIE, Y M. BERNAL. 1991. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria. Santiago.

AGUIRRE, J. Y G. EGLI. 1993. Primer registro de *Tyrannus melancholicus* para Chile. Boletín Informativo UNORCH 15: 4-5.

CANEVARI, M., P. CANEVARI, G.A. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRÍGUEZ, Y R.J. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves de Argentina. Tomo I. Fundación Acindar. Buenos Aires, Argentina.

MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1970. A guide to the birds of South America. Livingston Publishing Co. Wynnewood, Pennsylvania.

Boletín Chileno de Ornitología 1:27-28.
Unión de Ornitólogos de Chile 1994

REGISTRO DE GARCITA AZULADA *Butorides striatus* (CICONIIFORMES: ARDEIDAE) EN RIO LOA.

NELSON AMADO Y WALTER SIELFELD.

Grupo de Estudios Ornitológicos, Dpto. Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121 Iquique.

La Garcita Azulada *Butorides striatus* Linné, es una especie cosmopolita que habita en Africa, Asia, Australia, Indonesia, Polinesia y toda América del Sur hasta Argentina (Johnson y Goodall 1965).

Para Chile existen dos registros: Casablanca (cercanía de Valparaíso) y desembocadura del río Lluta, Arica (Blake 1977, Araya et al. 1991).

Blake (op. cit.) menciona dos subespecies para dichas localidades: *Butorides striatus striatus* en el

28 CONTRIBUCIONES BREVES.

río Lluta y *B. s. fuscicollis* en Valparaíso, aspecto no tratado por Araya et al. (op. cit.).

A lo anterior se debe agregar su presencia, aunque no documentada, en la localidad de Peine, Segunda Región (Estades 1992).

En la presente nota, se informa de un nuevo avistamiento realizado el 16 de agosto de 1992, en la desembocadura del río Loa, límite entre la Primera y Segunda Región, de un ejemplar asociado a juncas de la ribera del río y del cuál, se lograron tomar fotografías que sirvieron para su correcta identificación.

La coloración de las partes superiores gris azulado y las inferiores gris ceniza, así como la presencia de estrías conspicuas en la región de la nuca y garganta, permitieron identificar al espécimen como la subespecie *Butorides striatus striatus*.

LITERATURA CITADA.

ARAYA, B., G. MILLIE, Y M. BERNAL. 1991. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria. Santiago.

BLAKE, E. 1977. Manual of Neotropical Birds. Vol. 1. The University of Chicago Press, Chicago.

ESTADES, C. 1992. Avifauna de la segunda región de Antofagasta. Boletín Informativo UNORCH 14: 12-18.

Boletín Chileno de Ornitología 1:28.
Unión de Ornítólogos de Chile 1994

UN NUEVO REGISTRO PARA LA PROVINCIA DE OSORNO, DECIMA REGION.

ENRIQUE COUVE Y CARLOS BRAVO.

Unión de Ornítólogos de Chile, Casilla 637, La Unión.

El día 17 de julio de 1993, se llevó a cabo una reunión, de UNORCH Sur, de preparación del censo de aves acuáticas en la ciudad de Osorno. En dicha oportunidad se realizaron diferentes actividades, destacándose una salida a terreno en la que se visitó un campo en el sector de Huilma, 37 km al suroeste de Osorno.

En esta localidad se observaron 12 especies de aves rapaces, destacando la presencia de Bailarines (*Elanus leucurus*) y el avistamiento de un Halcón Perdiguero (*Falco femoralis*, Temiminck).

Posteriormente, el día 7 de agosto, durante otra salida a terreno realizada por ornítólogos de Osorno y Valdivia, se observó un ejemplar adulto de *Falco femoralis* en el sector de Trumao, 40 km al norte de Osorno.

En los últimos años, la especie ha sido observada por colegas de Temuco y Puerto Montt (Espinosa y von Meyer 1993), por lo cual se sugiere ampliar la distribución de esta especie; aún queda por dilucidar la subespecie de la cual se trataría, por cuanto Goodall et al. (1951) y Araya et al. (1986) establecen que *F. femoralis pichincae* se distribuiría entre Arica y Curicó, mientras que *F. femoralis femoralis* habitaría en la región de Magallanes.

LITERATURA CITADA.

ARAYA, B., G. MILLIE, Y M. BERNAL. 1986. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria. Santiago.

ESPINOSA, L. Y A. VON MEYER. 1993. Lista patrón de las aves de la Región de los Lagos, Chile. Boletín Informativo UNORCH 15: 27-37.

GOODALL, J.D., A.W. JOHNSON, Y R.A. PHILIPPI. 1951. Las aves de Chile. Vol 2. Platt Establecimientos Gráficos S.A. Buenos Aires.