

Boletín Chileno de Ornitología 2:27  
Unión de Ornólogos de Chile 1995

**REGISTRO DE *Plegadis chihi* (Vieillot, 1817)  
PARA LA PROVINCIA DE MALLECO, IX REGION, CHILE.**

JAIME GAETE S.<sup>1</sup> Y MARCELO SAAVEDRA M.<sup>2</sup>

1 Comisión Comunal del Medio Ambiente, Dr. Garriga 995, Purén.

2 Corporación Nacional Forestal IX Región, Casilla 637, Temuco.

El cuervo de pantano (*Plegadis chihi*) se distribuye en Chile desde Antofagasta hasta Osorno (Araya et al., 1991). Sin embargo, debido a la escasez de sus poblaciones silvestres, se encuentra incluido dentro de la categoría de especies En Peligro de Extinción (Glade, 1993).

La presente nota reporta el avistamiento de 12 ejemplares adultos de *P. chihi*, realizado el 20 de julio de 1994 en las vegas de Chacayal (38° 01' lat. S; 73° 02' long. O), localizadas 3 km al este de la ciudad de Purén dentro del predio con Rol 231-21, unos 3 km al norte de la ciudad de Purén.

Posteriormente, el día 30 de julio de 1994, se observó un grupo de seis ejemplares en el mismo sector. Las aves presentaban cabeza y cuello con brillo metálico purpúreo castaño, alas verde metálico y cola de color pardo.

LITERATURA CITADA

ARAYA, B.; G. MILLIE Y M. BERNAL. 1991. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria. Santiago.

GLADE, A. 1993. Libro rojo de los vertebrados terrestres chilenos. 2ª edición. Corporación Nacional Forestal.

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR. 1970. Carta escala 1:50000, coordenadas 3800 - 7300.

Boletín Chileno de Ornitología 2:27-28  
Unión de Ornólogos de Chile 1995

**SEGUNDO REGISTRO DE *Egretta tricolor* PARA CHILE**

RONNY PEREDO y NELSON AMADO

Grupo de Estudios Ornitológicos, Dpto. Cs. del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique.

La garza tricolor *Egretta tricolor* (Müller) 1776, también conocida como garza de Louisiana, se distribuye desde el sureste de Estados Unidos hasta la costa norte de América del Sur, siendo casual en Arequipa y costa sur de Perú (Koepcke 1970, Meyer de Schauensee 1970 y Blake 1977). La observación de un ejemplar en la localidad de Punta Teatinos, en la región de Coquimbo, constituye el primer registro de la especie para el país (Chester y Araya 1993).

En esta nota se comunica el avistamiento de un individuo en la desembocadura del río Lluta, Primera Región, durante el censo invernal de 1994. El individuo se encontraba en compañía de garzas chicas *Egretta thula* en una poza con vegetación tipo juncos. El tamaño, forma y patrón de coloración del plumaje concordarían con los antecedentes referidos por Blake (1977) para la subespecie *E. t. ruficollis*.

LITERATURA CITADA

ARAYA, B. Y S. CHESTER. 1993. Birds of Chile. Ed. Miguel Gallegos, Santiago.

BLAKE, E. 1977. Manual of Neotropical birds. Vol. 1. University of Chicago Press, Chicago.