

Boletín Chileno de Ornitología 2:27
Unión de Ornitólogos de Chile 1995

REGISTRO DE *Plegadis chihi* (Vieillot, 1817) PARA LA PROVINCIA DE MALLECO, IX REGION, CHILE.

JAIME GAETE S.¹ Y MARCELO SAAVEDRA M.²

¹ Comisión Comunal del Medio Ambiente, Dr. Garriga 995, Purén.

² Corporación Nacional Forestal IX Región, Casilla 637, Temuco.

El cuervo de pantano (*Plegadis chihi*) se distribuye en Chile desde Antofagasta hasta Osorno (Araya et al., 1991). Sin embargo, debido a la escasez de sus poblaciones silvestres, se encuentra incluido dentro de la categoría de especies En Peligro de Extinción (Glade, 1993).

La presente nota reporta el avistamiento de 12 ejemplares adultos de *P. chihi*, realizado el 20 de julio de 1994 en las vegas de Chacayal (38° 01' lat. S; 73° 02' long. O), localizadas 3 km al este de la ciudad de Purén dentro del predio con Rol 231-21, unos 3 km al norte de la ciudad de Purén.

Posteriormente, el día 30 de julio de 1994, se observó un grupo de seis ejemplares en el mismo sector. Las aves presentaban cabeza y cuello con brillo metálico purpúreo castaño, alas verde metálico y cola de color pardo.

LITERATURA CITADA

ARAYA, B.; G. MILLIE Y M. BERNAL. 1991. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria. Santiago.

GLADE, A. 1993. Libro rojo de los vertebrados terrestres chilenos. 2ª edición. Corporación Nacional Forestal.

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR. 1970. Carta escala 1:50000, coordenadas 3800 - 7300.

Boletín Chileno de Ornitología 2:27-28
Unión de Ornitólogos de Chile 1995

SEGUNDO REGISTRO DE *Egretta tricolor* PARA CHILE

RONNY PEREDO y NELSON AMADO

Grupo de Estudios Ornitológicos, Dpto. Cs. del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique.

La garza tricolor *Egretta tricolor* (Müller) 1776, también conocida como garza de Louisiana, se distribuye desde el sureste de Estados Unidos hasta la costa norte de América del Sur, siendo casual en Arequipa y costa sur de Perú (Koepcke 1970, Meyer de Schauensee 1970 y Blake 1977). La observación de un ejemplar en la localidad de Punta Teatinos, en la región de Coquimbo, constituye el primer registro de la especie para el país (Chester y Araya 1993).

En esta nota se comunica el avistamiento de un individuo en la desembocadura del río Lluta, Primera Región, durante el censo invernal de 1994. El individuo se encontraba en compañía de garzas chicas *Egretta thula* en una poza con vegetación tipo juncos. El tamaño, forma y patrón de coloración del plumaje concordarían con los antecedentes referidos por Blake (1977) para la subespecie *E. t. ruficollis*.

LITERATURA CITADA

ARAYA, B. Y S. CHESTER. 1993. Birds of Chile. Ed. Miguel Gallegos, Santiago.

BLAKE, E. 1977. Manual of Neotropical birds. Vol. 1. University of Chicago Press, Chicago.

28 CONTRIBUCIONES BREVES

KOEPCKE, M. 1970. The birds of Department of Lima. USA Laboratory of Ornithology, Cornell University Press.

MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1970. A guide to the birds of South America. Livingston Publishing Co. Wynnewood, Pennsylvania.

Boletín Chileno de Ornitología 2:28
Unión de Ornitólogos de Chile 1995

ATAQUE DE *Agriornis livida* (TYRANIIDAE) A *Passer domesticus* (PLOCEIDAE)

HERMAN NÚÑEZ

Sección Zoología, Museo Nacional de Historia Natural. Casilla 787, Santiago.

Esta nota es una contribución anecdótica al conocimiento de la biología del mero (*Agriornis livida*).

El día 14 de Mayo de 1995, a las 16:25 hrs, en la comuna de Macul, observamos (el autor y Nicolás Núñez) un ave que resultó ser un mero. El animal estaba en la punta de un poste de concreto con líneas eléctricas y telefónicas, y se mostraba muy inquieto. A su alrededor, posados en los cables sujetos al poste y en el ramaje de una tara (*Senna* sp), había unos siete gorrones (*Passer domesticus*) que se mostraban también inquietos emitiendo sus gritos característicos de alarma, frecuentes, agudos y fuertes. Varias de estas últimas aves se posaron en las cercanías del mero, un poco más abajo de los cables. El mero voló hacia uno de los gorrones. Al huir este último, el mero lo siguió por corto trecho para retornar a su percha. Desde allí renovó su actitud vigilante.

Varios otros gorrones, hasta en cinco oportunidades, fueron perseguidos por breve lapso. El mero, al realizar lo que estoy llamando ataque, lo hacía con el pico abierto y volando muy batido aunque lento. El tiempo de observación fue de siete minutos, al cabo de los cuales voló en dirección al norte.

Esta especie de tiránido vive en nuestro país desde el valle de Copiapó hasta Valdivia (Johnson 1967). Este mismo autor documenta que la especie se alimenta de insectos, lagartijas, anfibios, pequeños roedores, huevos o polluelos en los nidos. Martínez del Río (1992) documentó un ataque exitoso de mero sobre un picaflor chico (*Sephanoides galeritus*) en un quintral (*Tristerix aphyllus*). El autor señala que la estrategia usada por el mero es la emboscada. Adicionalmente, Paz (1991) cita un comportamiento similar en su congénere *A. microptera*, el cual fue observado atacando gorrones.

Estos antecedentes sugieren que la actitud del ave observada por mí es un ataque depredador y no una conducta de otra naturaleza como defensiva de territorio, por ejemplo.

El mero es una especie que puede llegar a pesar hasta 100 g (Humphrey et al. 1970) y por tanto sería capaz de subyugar a un gorrión cuyo peso se estima en unos 28 g (Humphrey et al. 1970). A partir de esta casuística se podría señalar que los meros incorporan a su dieta otras aves adultas además de las presas señaladas por Johnson (1967) y que los gorrones son seleccionados, pues Morgesen (citado por Humphrey et al. 1970) indica que éstos les temen a lo meros como si fueran halcones.

LITERATURA CITADA

HUMPHREY, P.S., D. BRIDGE, P.W. REYNOLDS y R.T. PETERSON. 1970. Preliminary Smithsonian manual for the birds of Isla Grande (Tierra del Fuego). Smithsonian Institution, Washington D.C.

JOHNSON, A.W. 1967. The birds of Chile and adjacent Regions of Argentina, Bolivia and Perú. Vol II. Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires.

MARTÍNEZ DEL RÍO, C. 1992. Geart Shrike-Tyrant predation on a Green-Backed Firecrown. The Wilson Bulletin 104(2):368-369.

PAZ, D. 1991. La captura de aves por el gaucho común (*Agriornis microptera*). Nuestras Aves 25:26.