

- Revista Chilena de Historia Natural 60: 321-336.
- GOODALL, J.D., JOHNSON, A.W. & R. A. PHILIPPI. 1946. Las aves de Chile, su conocimiento y sus costumbres. Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires, Argentina.
- HELLMAYR, C.E. 1932. Birds of Chile. Field Museum Natural History Publications 308 (Zoological Series) 19: 1-472.
- HOFFMANN, A. 1998. El árbol urbano en Chile. Tercera edición. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile.
- JOHNSON, A. 1967. The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Perú. Vol. II. Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires, Argentina.
- SABAG, C. 1993. El rol de las aves en la dispersión de semillas en un bosque templado secundario de Chiloé (42° S). Tesis de magíster, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago.
- SMITH-RAMÍREZ, C. & J. ARMESTO. 1998. Nectarivoría y Polinización por aves en *Embothrium cocineum* (Proteaceae) en Chiloé, Chile. Revista Chilena de Historia Natural 71: 51-63.
- WILLSON, M.F., SMITH-RAMÍREZ, C., SABAG, C. & J. HERNÁNDEZ. 1996. Mutualismos entre plantas y animales en bosques templados de Chile. En Armesto, J., Villagrán, C & MTK Arroyo (eds.). Ecología de los bosques nativos de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.

Boletín Chileno de Ornitología 9:26-28
Unión de Ornitólogos de Chile 2002

NUEVO AVISTAMIENTO DEL GAVIOTIN DE SANDWICH (*Sterna sandvicensis*) EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE

MANUEL MARÍN

mma95@hotmail.com. Casilla 15 Melipilla. Chile

Abstract. This note summarizes the records of the Sandwich Tern (*Sterna sandvicensis*) for Chile and provides information on two new sight records at 33° S. As pointed out by Hughes (1988) this species is extending its winter range along western South America. It might be extending farther south. Its inclusion on the Chilean bird list is based on four sight records and two unpublished photographs, one taken by R. McFarlane in 1973 and a second taken by R. Schlatter in 1985.

El Gaviotín de Sandwich (*Sterna sandvicensis*) es una ave migratoria del hemisferio norte que llega por el lado este de Sudamérica hasta Argentina (Blake 1977, Narosky & Di Giacomo 1993). Por la costa del Pacífico llega hasta el sur del Perú (Blake 1977, Hughes 1988).

El primer registro para el Perú fue en 1971 en el departamento de Piura (5°51'S) (Campbell 1971). Hughes (1970) no la menciona para la zona de Mollendo, pero Hughes (1988) menciona que desde 1973 la especie ha

sido reportada en diferentes sitios a lo largo del Perú. Hughes (1988) menciona una expansión definitiva en su rango invernal y es actualmente considerada regular en la zona de Mollendo entre noviembre y abril, aunque existen registros para octubre, mayo y junio. Esta especie es poco numerosa, encontrándose en grupos de no más de 20 individuos y siempre en asociación de otra especie migratoria, el Gaviotín Elegante (*Sterna elegans*).

Para Chile hay cuatro registros visuales, dos relativamente bien descritos y regis-

trados (McFarlane 1974 y Peredo & Amado 1995) y los otros dos en los cuales los autores sólo mencionan la presencia de la especie, pero sin un mínimo de detalles (Schlatter 1992 y Araya *et al.* 1992).

El primer registro para Chile fue obtenido por McFarlane (1974) quien observó y fotografió un solo individuo entre Gaviotines Elegantes el 1 de abril de 1973, en La Liserá, (18°29'S), provincia de Arica. El segundo registro fue en marzo de 1985 en Tongoy (30°15'S), provincia de Elqui. Aquí la especie es mencionada pero no se entrega más información (Schlatter 1992). Con posterioridad, R. Schlatter entrega copia de una fotografía a UNORCH de un individuo entre una bandada de unos (30+) Gaviotines Elegantes y algunas gaviotas, tomada en marzo de 1985, en Tongoy. Esta fotografía es la única evidencia física de esta especie para el país. Luego Araya *et al.* (1992, 5ª edición) mencionan el registro de McFarlane y agregan uno en la "Península de Tumbas," deletreado erróneamente, es Península de Tumbes (36°40'S), provincia de Concepción [esto aparece corregido en la novena edición (Araya *et al.* 2000)] sin dar ningún detalle de fechas, número de individuos, ni referencia alguna. Curiosamente, Araya & Chester (1993, edición en Inglés) no mencionan este registro, y sólo citan el de McFarlane (1974). Luego, Peredo & Amado (1995) dan un nuevo registro visual de esta especie en Cavanha (20°14'S), provincia de Iquique, en noviembre de 1992. Estos autores observaron un número indeterminado de individuos junto a Gaviotines Elegantes. Esta última observación también es mencionada por Araya *et al.* (2000).

El 7 de abril del 2001, encontré un grupo de 3 Gaviotines de Sandwich entre una bandada de unos 100 Gaviotines Elegantes, en la desembocadura del Río Maipo (33°36'S), provincia de San Antonio. Al retornar al lugar el día 11 de abril con la intención de fotografíarlos, ya no estaban; sólo quedaban unos 20 Gaviotines Elegantes. El 24 de abril de 2002, en una visita regular al mismo sitio nuevamente observé un grupo de 4 individuos junto a unos 30 Gaviotines Elegantes. Tal como en previas observaciones al sur del Perú y norte de Chile, esta especie estaba asociada a Gaviotines Elegantes. El Gaviotín de Sandwich es muy fácil de distinguir: de un tamaño algo más pequeño pero similar al Gaviotín Elegante. Su plumaje de invierno, el cual es el que se ha observado en Chile, presenta una

frente blanca y cresta negra. También presenta un pico negro con la punta amarilla. Otra especie que en su plumaje de invierno presenta el pico negro con punta amarilla es el Gaviotín Piquerito (*Sterna trudeaui*) (detalle no mencionado por Araya *et al.* 1986, ni posteriores ediciones) pero éste es más pequeño y no presenta una cresta negra sino que una anteojera negra.

La inclusión del Gaviotín de Sandwich en la lista de las aves de Chile está basada en algunos avistamientos, una fotografía sin publicar que tomó McFarlane en Arica, en abril de 1973 (no disponible) y una fotografía de un individuo entre unos Gaviotines Elegantes y Gaviotas tomada por R. Schlatter (depositada posteriormente en UNORCH) tomada en Tongoy, en marzo de 1985. Como es mencionado por Hughes (1988), esta especie ha extendido su rango invernal en Perú y puede que también lo esté haciendo en Chile. Se recomienda observar con más cuidado las bandadas de Gaviotines Elegantes. Su similitud con esta especie puede haber influido en que su presencia en el país haya pasado desapercibida. De momento, en Chile el Gaviotín de Sandwich puede ser considerado como un visitante regular pero poco común.

Se agradece a dos revisores anónimos y a R. Schlatter por el mejoramiento de esta nota.

LITERATURA CITADA

- ARAYA, B., & S. CHESTER. 1993. Birds of Chile. Latour, Santiago.
- ARAYA, B., G. MILLIE, & M. BERNAL. 1986. Guía de Campo de las aves de Chile (1a edición). Editorial Universitaria Santiago.
- ARAYA, B., G. MILLIE, & M. BERNAL. 1992. Guía de Campo de las aves de Chile (5a edición). Editorial Universitaria Santiago.
- ARAYA, B., G. MILLIE, & M. BERNAL. 2000. Guía de Campo de las aves de Chile (9a edición). Editorial Universitaria Santiago.

28 COMUNICACIONES BREVES

- BLAKE, E. R. 1977. Manual of Neotropical Birds. Vol. 1. Univ. Chicago Press.
- CAMPBELL, K. E. 1971. First report of Sandwich Terns in Peru. *Auk* 88:676.
- HUGHES, R. A. 1970. Notes on the birds of the Mollendo district, southwestern Peru. *Ibis* 112: 229–241.
- HUGHES, R. A. 1988. Nearctic migrants in southwest Peru. *Bulletin British Ornithologist Club*. 108:29–43.
- McFARLANE, R. 1974. Unusual avian migrants in Tarapacá. *IDESIA* 3:181–184.
- NAROSKY, T. & A. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vazquez Mazzini Editores & L.O.L.A., Buenos Aires.
- PEREDO, R. & N. AMADO. 1995. Observación de Gaviotín de Sandwich en Iquique. *Boletín Chileno Ornitología* 2:29.
- SCHLATTER, R. 1992. Observaciones de aves en el norte chico. *Boletín Informativo (UNORCH)*. 13:7–8.

Boletín Chileno de Ornitología 9:28–30
Unión de Ornitólogos de Chile 2002

EL CHORLO GRITÓN (*Charadrius vociferus*) NIDIFICA EN CHILE

MANUEL MARIN^{1,2}, ENRIQUE COUVE² Y CLAUDIO VIDAL²

¹Casilla 15, Melipilla, Chile, mma95@hotmail.com

²Fantastico Sur, Casilla 455, Punta Arenas, Chile, birding@chileaustral.com.

Abstract. We report the first breeding record for the Killdeer (*Charadrius vociferus*) for Chile, found breeding at the Lluta river mouth, near Arica, Tarapacá Region, with 3 recently hatched nestlings on early September, and a second nest with two pulli of a few days old on late October which might indicate that the species might be a late Austral winter breeder.

El Chorlo Gritón (*Charadrius vociferus*) tiene una distribución disjunta en las Américas, con una población residente en Norteamérica desde Canadá a México, una segunda población en las Antillas y una tercera población en el oeste de Sudamérica desde Ecuador al norte de Chile. Algunas poblaciones del norte llegan a pasar el invierno en Centroamérica y norte de Sudamérica (Philippi 1964, Blake 1977, AOU 1998). Su presencia en Chile es conocida por observaciones y especímenes por lo menos desde 1851, todas realizadas en los alrededores de Arica (e.g., Hellmayr 1932, Hellmayr & Conover 1948, Philippi 1964, Johnson 1965, Araya & Millie 2000).

Sorpresivamente, a pesar de las múltiples publicaciones sobre las aves del extremo norte de Chile, hay muy pocos registros de

la especie en el país. Hellmayr (1932) menciona un antiguo espécimen sin localidad específica, etiquetado "Chile." Barros (1954) observó un grupo de 3 individuos, de los cuales capturó uno, entre el 14 y 17 de marzo de 1948, cerca de Chinchorro, Arica. Philippi (1964) menciona un espécimen de 1851 y una observación hecha por él, en junio de 1935. Sin embargo, Philippi (1936) reportando sobre las aves del viaje hecho en junio de 1935, no menciona la especie. Johnson (1965) indica que él nunca lo observó en Chile y su inclusión a las aves de Chile se debe a un antiguo espécimen y que Philippi lo escuchó en junio de 1935. Posteriormente, otros autores repiten la misma información de Philippi.

Una de las pocas menciones hechas para su nidificación en Sudamérica, fue realizada por Johnson *et al.* (1972) en la cual indi-