LITERATURA CITADA

- BURHANS, D. E y F. R. THOMPSON, III. 1998. Effects of time and nest-site characteristics on concealment of songbird nests. *Condor* 100:663-672.
- CODY, M.L. (Ed.) 1985. *Habitat selection in birds*. Academic Press. Orlando.
- DIJAK, W.D., B. TANNENBAUM y M.A. PARKER. 1990. Nest-site characteristics affecting success and reuse of red-shouldered hawk nests. *Wilson Bulletin* 102:480-486.
- ESTADES, C.F. y S.A. TEMPLE. 1999. Deciduous-forest bird communities in a fragmented landscape dominated by exotic pine plantations. *Ecological Applications* 9: 573-585
- JOHNSON, A.W. 1967. *The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru*. Vol. 2. Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires.
- MURPHY, M.T. 1983. Nest success and nesting habits of eastern kingbirds (*Tyrannus tyrannus*) and other flycatchers. *Condor* 85:208-219.
- NEWTON, I. 1998. *Population limitation in birds*. Academic Press. San Diego.

Boletín Chileno de Ornitología 6: 27 - 28
Unión de Ornitólogos de Chile 1999

NUEVA INFORMACION SOBRE LA DISTRIBUCION DE RECURVIROSTRIDAE EN CHILE

NELSON AMADO P.¹, LORETO MIRANDA S.¹ y MARÍA DOLORES GARCÍA ²
1 Depto. Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121, Iquique, Chile.
2 Unión de Ornitólogos de Chile, Casilla 13183, Santiago-21, Chile.

Actualmente dos especies representan a la familia Recurvirostridae en Chile: el perrito (*Himantopus himantopus* Linnaeus, 1758) y el caití (*Recurvirostra andina* Philippi y Landbeck 1861). La primera se distribuye desde Huasco (III Región) hasta Llanquihue (X Región), mientras la segunda es un habitante de la zona de la puna, desde el límite norte del país hasta la laguna del Negro Francisco (III Región) (Araya *et al.* 1998).

El 1 de Noviembre de 1996 fueron avistados dos ejemplares de perrito en la Rinconada de Mejillones, II Región. De acuerdo al patrón de coloración de sus plumajes, fueron determinados como macho y hembra de *Himantopus himantopus melanurus* (Goodall *et al.* 1951, Blake 1977, Hayman *et al.* 1986). La Rinconada es un sector ubicado en el extremo occidental de la Bahía de Mejillones del Sur (23° 05' 42"S, 70° 28'W), cuya línea de costa se desvía hacia el norte, siguiendo la prolongación de los altos cerros de la península del mismo nombre, lo que determina la formación de una ensenada bastante protegida de la acción del viento suroeste y de grandes olas provenientes del océano abierto. La playa es angosta, con sustrato arenoso y de suave pendiente en la franja intermareal, profundizándose abruptamente pocos metros después de internarse en el mar. En consecuencia, sólo suaves olas con escasa energía llegan hasta la orilla, posibilitando que aves de tarsos largos como el perrito, deambulen con las patas sumergidas en aguas de poca profundidad en busca de alimento.

Por otro lado, desde septiembre de 1997, se ha estado realizando un programa periódico de censos de aves en la desembocadura del río Lluta en la I Región, el que forma parte de un estudio sobre la estructura comunitaria aviar. Entre las observaciones realizadas, destaca la presencia de un ejemplar de perrito, el que permaneció en el lugar por más de un mes (aproximadamente desde el 2 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 1997). Este presentaba la corona y lados de la cabeza color negro y carecía de una banda blanca en el manto, características que concuerdan con aquellas descritas para *Himantopus himantopus mexicanus* (Blake 1977, Udvardy 1977, Hayman *et al.* 1986, del Hoyo *et al.* 1996).

El género *Himantopus* muestra la mayor complejidad taxonómica dentro de la familia Recurvirostridae (del Hoyo *et al.* 1996). Aun cuando algunos autores tratan las formas *mexicanus* y *melanurus* como especies distintas, se acepta más ampliamente la existencia de una sola especie de amplia distribución, *Himantopus himantopus* con dos subespecies en América, *H. himantopus mexicanus* Muller, 1776 e *H. h. melanurus* Vieillot, 1817 (del Hoyo *et al.* 1996). Este criterio fue considerado tempranamente por Goodall *et al.* (1951) quienes presentaron para Chile a la última citada; sin embargo con posterioridad a ellos, el Perrito ha sido asignado indistintamente a las dos formas señaladas (Araya *et al.* 1995, Araya *et al.* 1998, Blanco y Canevari 1992, 1993 y 1994, Rottmann 1995).

28 CONTRIBUCIONES BREVES

La forma *H. himantopus melanurus* se distribuye en Chile desde Huasco (III Región) hasta Llanquihue (X Región) (Goodall *et al.* 1951; Araya *et al.* 1998), por lo que el presente avistamiento amplía en unos 700 kilómetros su rango distribucional septentrional para nuestro país. Por otro lado, la observación de la subespecie *H. h. mexicanus* en la desembocadura del río Lluta, constituiría un primer registro para Chile, asumiéndose un desplazamiento ocasional hacia el sur de ejemplares provenientes del Perú, donde ambas formas comparten un área geográfica en el valle Ucayali (Hayman *et al.* 1986, del Hoyo *et al.* 1996).

Finalmente, se comunica el avistamiento de un ejemplar de caití en la costa de Arica, el 21 de mayo de 1998, hecho poco frecuente para esta especie andina. Al respecto existe un registro previo para el norte de Chile y otro en la costa de Mollendo, Perú, en los meses de abril y julio (Hayman *et al.* 1986).

LITERATURA CITADA

- ARAYA, B., M. BERNAL, R. SCHLATTER Y M. SALLABERRY. 1995. Lista patrón de las aves chilenas. Tercera edición. Ed. Universitaria, Santiago.
- ARAYA, B., G. MILLIE Y M. BERNAL. 1998. Guía de campo de las aves de Chile. Octava edición. Ed. Universitaria, Santiago.
- BLAKE, E. 1977. Manual of neotropical birds. Vol. 1. The University of Chicago Press, Chicago.
- BLANCO, D.E. Y P. CANEVARI (compiladores). 1992. Censo neotropical de aves acuáticas 1991. Programa de ambientes acuáticos neotropicales (NWP), Buenos Aires.
- BLANCO, D.E. Y P. CANEVARI (compiladores). 1993. Censo neotropical de aves acuáticas 1992. Humedales para las Américas (WA), Buenos Aires.
- BLANCO, D.E. Y P. CANEVARI (compiladores). 1994. Censo neotropical de aves acuáticas 1993. Humedales para las Américas, Buenos Aires.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT Y J. SARGATAL (eds.). 1996. Handbook of the birds of the world. Vol 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
- GOODALL, J.D., A.W. JOHNSON Y R.A. PHILIPPI. 1951. Las aves de Chile. Vol. 2. Platt Establecimientos Gráficos S. A., Buenos Aires.
- HAYMAN, P., J. MARCHANT Y T. PRATER. 1986. Shorebirds: An identification guide. Houghton Mifflin Company, Boston.
- ROTTMANN, J. 1995. Guía de identificación de aves de ambientes acuáticos. (Editores J. Aguirre, G. Egli, C. Estades y C. Tala). Unión de Ornítólogos de Chile, Santiago.
- UDVARDY, M. 1977. The Audubon Society Field Guide to North American Birds, Western Region. A. Knopf Ed., New York.

NIDIFICACION DE GAVIOTA AUSTRAL (*Larus scoresbii*) EN ISLA DOÑA SEBASTIANA, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, CHILE.

LUIS A. ESPINOSA G¹ Y ANDREAS P. VON MEYER H²

¹ UNORCH, Casilla 301, Puerto Varas, Chile, Correo e: legpevar@hotmail.com

² UNORCH, Casilla 711, Puerto Montt, Chile.

La gaviota austral (*Larus scoresbii*) es una especie que habita desde el extremo austral de Chile hasta Chiloé y casualmente hasta Isla Mocha (Araya *et al.* 1996). En Chile, su límite norte en invierno es Talcahuano (Clark, 1986). Schlatter, (com pers) tras una observación hecha por el segundo autor de un ejemplar inmaduro en el muelle de Valdivia en 1988, comentó que se trataba de una recuperación de su antigua zona de distribución que tuvo que abandonar la especie con el retiro del lobo común (*Otaria byronia*) en la localidad. Harrison (1983) indica que la gaviota austral nidifica desde el sur hasta los 42°S aprox. tanto en Chile como en Argentina. Murphy (1936), Johnson (1967) y Venegas (1994) señalan que su lugar de nidificación es en Tierra del Fuego y Estrecho de Magallanes.

Durante una visita a la Isla Doña Sebastiana en la Décima Región (41°45'S; 73°49'W) en el mes de enero de 1997, 1998 y 1999 se observó un máximo de 20 polluelos de esta especie acompañados de unos 30 adultos. El lugar de nidificación estaba al pie de un acantilado de unos 60 m en un sector alcanzable para la rompiente y expuesto a los vientos del oeste. Todo el grupo estaba concentrado sólo en ese sector en comparación con *Larus dominicanus*