

NUEVO REGISTRO DE JACANA *Jacana jacana* (LINNÉ, 1766)  
PARA LA I REGIÓN DE TARAPACÁ, CHILE

LORETO MIRANDA SALINAS

Grupo de Estudios Ornitológicos, Departamento Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat,  
Casilla 121, Iquique Chile

El único representante de Jacanidae en Sudamérica es *Jacana jacana*, que tiene seis subespecies, debido a que es altamente sedentaria. Hay especímenes que suelen extraviarse, principalmente los juveniles; lo que hace pensar que el único registro en Chile, en Valparaíso durante 1895, fue posiblemente un animal extraviado que atravesó los Andes, y que pertenecía a la subespecie *Jacana jacana jacana* (Araya *et al.* 1998). Esta subespecie se distribuye en las Guyanas, en gran parte del sur de Brasil, en el este boliviano, en Santa Fe y norte de Buenos Aires (Blake 1977, Hayman *et al.* 1986).

En mayo de 1998 se observó un ejemplar de *Jacana jacana* en la desembocadura del río Lluta, presentaba la frente de color blanco, corona, nuca y sus costados de color amarillo anaranjado, el cuello, pecho y vientre de color amarillo claro, la rabadilla blanca, culmen de color marfil, manto y lomo de color mostaza, alas de color oliva y las patas de color amarillo pálido donde resaltaba lo extremadamente largo de sus dedos. De acuerdo a esta descripción, el ejemplar observado no coincide en totalidad con lo descrito por Hayman *et al.* (1986) y Canevari

*et al.* (1991) para juveniles y adultos. Probablemente este ejemplar corresponde a un estado del plumaje en transición de volatón a juvenil, esto porque aún no presentaba desarrollados el escudo frontal y las carúnculas típicas de esta especie (Hayman *et al.* 1986, Canevari *et al.* 1991).

LITERATURA CITADA

- ARAYA, B., G. MILLIE Y M. BERNAL. 1998. Guía de Campo de las Aves de Chile. Ed. Universitaria. Santiago.
- BLAKE, E. 1977. Manual of neotropical birds. Vol. 1. The University of Chicago Press, Chicago.
- CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ Y R. STRANECK. 1991. Nueva Guía de las Aves de Argentina. Ediciones Fundación Acindar, Buenos Aires.
- HAYMAN, P., J. MARCHANT Y T. PRATER. 1986. Shorebirds. An Identification Guide to the Waders of the World. Houghton Mifflin Company, Boston.

CONFIRMACIÓN DE LA GOLONDRINA DE MAR DE CEJA BLANCA  
(*Pelagodroma marina*) EN AGUAS CHILENAS

FEDERICO JOHOW

Unión de Ornitólogos de Chile, Casilla 13.183, Santiago - 21, Chile

La golondrina de mar de ceja blanca (*Pelagodroma marina*) es una especie pelágica de distribución muy extensa, que incluye el océano Atlántico a lo largo de toda África y Sudamérica, el océano Índico, el océano Pacífico en casi toda su extensión entre la línea del Ecuador y el Trópico de Capricornio y las aguas que rodean Oceanía (del Hoyo *et al.* 1992,

Narosky e Izurieta 1999, Harrison 1983).

Esta especie, que se distingue fácilmente de cualquier otro miembro de su familia por ser la única que posee una banda superciliar blanca bastante ancha, había sido mencionada sólo una vez en aguas chilenas, aunque sin documentar ejemplares (Pearman 1995), quizá por la