

que nidifica en lugares más altos y en pastizales de la planicie siempre cerca de los acantilados. Probablemente la concentración de *L. scoresbii* en ese lugar sea una defensa contra *L. dominicanus* notoriamente dominante en la isla y que constantemente hace vuelos rasantes sobre la colonia de *L. scoresbii*.

La gaviota austral al parecer es dependiente en gran medida de las loberías cercanas al lugar y, en menor grado, de las colonias de las tres especies de cormoranes que nidifican en la isla. Ha sido observada en pequeño número durante todo el año en Punta Chocoi, lugar cercano a Carelmapu en el Canal de Chacao donde posiblemente también nidifique y donde ha sido observada depredando sobre huevos de Cormorán Imperial (*Phalacrocorax atriceps*) en septiembre de 1996.

Este registro de nidificación es el de menor latitud que se conozca en Chile. Cabe señalar que fue observado en el verano de 1995 un ejemplar volantón de esta gaviota aun siendo alimentado por sus progenitores en el mismo lugar donde se encontró la presente nidificación, no pudiendo asegurar que nació en el mismo sector. En una expedición a ese lugar en 1993 no había indicios de nidificación para la especie señalada, (Espinosa y von Meyer 1994).

LITERATURA CITADA

- ARAYA B., G. MILLIE Y M. BERNAL, 1996. Guía de Campo de las Aves de Chile, Sexta edición, Edit. Universitaria, Santiago.
- CLARK R. 1986. Aves de tierra del Fuego y Cabo de Hornos, Guía de Campo. L.O.L.A. Buenos Aires.
- ESPINOSA, L Y A. VON MEYER. 1994. Expedición a Isla Doña Sebastiana 1993. Boletín Chileno de Ornitología 1: 24-25.
- HARRISON P. 1983. Seabirds, an Identification Guide. Croom Helm. London.
- JOHNSON, A.W. 1967. The Birds of Chile and Adjacent Regions of Argentina, Bolivia and Perú. Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires.
- MURPHY R. C. 1936. Oceanic Birds of South America. The McMillan Company and American Museum of Natural History, Nueva York.
- VENEGAS C. 1994. Aves de Magallanes. Ediciones Universidad de Magallanes, Punta Arenas.

Boletín Chileno de Ornitología 6: 29 - 32
Unión de Ornítólogos de Chile 1999

DISTRIBUCION Y SITUACION DEL PLAYERO GRANDE DE ALAS BLANCAS (*Catoptrophorus semipalmatus*) EN CHILE

MANUEL MARÍN

Western Foundation of Vertebrate Zoology, 439 Calle San Pablo, Camarillo CA 93012, USA.

En Chile, las migraciones de aves boreales usualmente ocurren de octubre a mayo. El Playero Grande de Alas Blancas *Catoptrophorus semipalmatus*, Gmelin, 1789, es uno de los aproximadamente 40 visitantes boreales que se han registrado en Chile. La subespecie que visita el país es *Catoptrophorus semipalmatus inornatus*, Brewster, 1887 (AOU 1957, Blake 1977). Esta subespecie nidifica en el sudoeste de Canadá y por el oeste de los Estados Unidos, hasta Colorado y Dakota del Sur (Blake 1977, AOU 1998).

Se recopilieron los datos de especímenes de museo, especímenes recolectados y reportados en la literatura y las observaciones de campo que han sido publicadas. Se graficaron los datos de especímenes y de observaciones de campo usando la latitud y el mes de la observación o recolecta.

La recopilación indica que el estatus en Chile de este playero ha sido bastante confuso por varias décadas. Por ejemplo, en las mayores publicaciones de autores basados en Norteamérica, Hellmayr (1932) y Hellmayr y Conover (1948) no lo mencionan para Chile. AOU (1957, 1983) mencionan que esta especie inverna a lo largo de la costa del Pacífico hasta el norte de Chile. Meyer de Schauensee (1970, 1982) y Blake (1977) mencionan visitas ocasionales al norte de Chile. Finalmente, AOU (1998) amplía su rango hasta Chile central. Entre los autores chilenos, Philippi (1936) lo menciona por primera vez para Chile, basado en un ejemplar capturado en Arica en Septiembre de 1851. Housse (1945) repite el mismo registro de Philippi. Goodall *et al.* (1951) lo mencionan como visitante casual a la zona de Tarapacá. Philippi (1951) menciona la observación de ocho aves y tres nuevos especímenes para Arica, y tres especímenes capturados por F. Behn en Iquique. El trabajo de Philippi (1964), que en general es poco citado por extranjeros menciona especímenes de Arica, Iquique y Valparaíso. Goodall *et al.* (1964) agregan más detalles del

30 CONTRIBUCIONES BREVES

especimen de Valparaíso, citado por Philippi y que fue capturado en abril de 1956. Johnson (1964) lo nombra como visitante ocasional a la costa de Arica, y como posible en Santiago. Mas tarde Araya y Millie (1986) repiten lo de Philippi (1964) agregando observaciones en Tongoy, lo mismo es repetido por Araya y Chester (1993).

Al revisar la literatura se encontró que esta especie ha sido capturada y observada en la zona centro-sur desde principios de 1950 (e.g., Barros 1952) con un ejemplar capturado y otro observado a los 35°49' S. Se encontró la mayoría de las observaciones en los alrededores de los 32° a 34°S (ver Fig.1) (e.g. Philippi 1964, Goodall et al. 1964, Bailey 1969, Ewer 1971 y otros). Muchas de estas publicaciones han sido ignoradas por varios autores, y algunos como Howell y Webb (1995) se atribuyen como propios nuevos registros de distribución para dichas localidades. Este tipo de problemas es debido principalmente, a la inapropiada revisión de la literatura. Entre los varios nombres que se han usado para esta especie se incluye: Playero de alas blancas, Playero grande de alas blancas, Chorlo de espejo, Llevador de espejo semipalmado sin adornos, y Playero grande, lo que también puede ser una causa de confusión para algunos investigadores.

En años recientes, con un mayor número de observadores, no sólo el número de registros de esta especie se ha incrementado sino que también estos indican que algunos ejemplares se quedan más tiempo de lo esperado (Bailey 1969, Ewer 1971, Devillers y Terschuren 1976, Martínez 1988, Schlatter 1992, Klemens 1997, Vuilleumier 1997, Aguirre y Seeger 1998). En esta revisión se encontraron 10 especímenes de museo y observaciones de 21 localidades diferentes del país, con la mayoría de los registros en el mes de febrero (Fig. 1). Además, la especie ha sido registrada en casi todos los meses del año excepto agosto y octubre (Fig. 1). En el sur del Perú, en el área de Mollendo, en ciertos años se le puede encontrar en pequeñas bandadas de hasta 26 ejemplares durante todo el año. Las épocas de mayor abundancia en Mollendo, son durante los períodos de movimientos migratorios, entre octubre-noviembre y febrero-marzo (Hughes 1987, Hughes 1981-1988, notas de campo sin publicar). Haciendo observaciones sistemáticas en el norte de Chile, es posible que se encuentren resultados similares a los de Hughes.

También en esta revisión se encontró que a esta especie se le puede encontrar más al sur de lo que comúnmente se cita, (por ejemplo, Barros 1952, Vuilleumier 1995). Pero no se debe descartar la posibilidad que sus visitas en las latitudes de más al sur sean solamente ocasionales. En todo caso las visitas a las zonas más centrales parecen ser más regulares de lo que se cree, como es demostrado por estudios de largo plazo, e.g., Jorge *et al.* (1998) que lo mencionan como visitante regular para la zona de Coquimbo.

Factores que han ayudado y pueden seguir ayudando a dilucidar problemas de distribución y estatus de algunas especies, son el aumento de observadores de campo, y estudios de largo plazo, que en años pasados se limitaban a pocos individuos y publicaciones.




Figura 1. Grados de latitud sur versus mes representando la distribución del Playero grande de alas blancas en Chile. Círculos negros representan especímenes de museo, ya sea reportados en la literatura u observados personalmente. Círculos sin relleno representan observaciones de campo reportadas en la literatura.

AGRADECIMIENTOS

Se le agradece a la señora Erika de Behn, por permitirme examinar la colección del difunto Dr. F. Behn. También se le agradece a dos revisores anónimos por mejorar esta nota.

LITERATURA CITADA

- AGUIRRE, J. Y H. SEEGER. 1998. Registro del playero de patas largas (*Calidris himantopus*), en la zona central de Chile. Boletín Chileno de Ornitología 4:32-33.
- AOU (American Ornithologists' Union). 1957. Check-list of North American birds. Fifth edition. Port City Press, Baltimore, Maryland.
- AOU (American Ornithologists' Union). 1983. Check-list of North American birds. Sixth edition. Allen Press, Lawrence, Kansas.
- AOU (American Ornithologists' Union). 1998. Check-list of North American birds. Seventh edition. Allen Press, Lawrence, Kansas.
- ARAYA, B. M. Y G. MILLIE H. 1986. Guía de campo de las aves de Chile. Editorial Universitaria, Santiago.
- ARAYA, B. Y S. CHESTER. 1993. The birds of Chile. Latour Ediciones, Santiago.
- BAILEY, B. M. 1969. Birds recorded near Zapallar. Boletín Ornitológico 1(1):6.
- BARROS, R. 1952. El chorlo espejo, *Catoptrophorus semipalmatus inornatus* (Brewster) en Chile. Revista Universitaria 37:11-12.
- BLAKE, E. R. 1977. Manual of Neotropical birds. University of Chicago Press, Chicago.
- DEVILLERS, P. Y J. A. TERSCHUREN. 1976. Some distributional records of migrant North American charadriiformes in coastal South America (continental Argentina, Falkland Islands, Tierra del Fuego, Chile and Ecuador). Le Gerfaut 66:107-125.
- EWER, J. R. 1971. Presencia de algunas aves en las costas Chilenas durante el mes de junio de 1971. Boletín Ornitológico 3(2):1-2.
- GOODALL, J. D., A. W. JOHNSON Y R. A. PHILIPPI B. 1951. Las aves de Chile, su conocimiento y sus costumbres. Vol. 2. Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires.
- GOODALL, J. D., A. W. JOHNSON, R. A. PHILIPPI B., F. BEHN, G. R. MILLIE Y L. E. PEÑA. 1964. Segundo suplemento de las aves de Chile. Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires.
- HELLMAYR, C. E. 1932. The birds Of Chile. Field Museum of Natural History, Zoological series Vol. 19.
- HELLMAYR, C. E., y B. CONOVER. 1948. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Field Museum of Natural History, Zoological series Vol 13, Part 1, Number 3.
- HOUSSE, R. 1945. Las aves de Chile, en su clasificación moderna, su vida y costumbres. Ediciones Universidad de Chile, Santiago.
- HOWELL, S. N. G. y S. WEBB. 1995. Noteworthy bird observations from Chile. Bulletin of the British Ornithologists' Club 115:57-66.
- HUGHES, R. A. 1981-1988. Notas de campo sin publicar, depositadas en el Museum of Natural Science, Louisiana State University.
- HUGHES, R. A. 1987. Nearctic migrants in southwest Perú. Bulletin of the British Ornithologist' Club 108:29-43.
- JOHNSON, A. W. 1965. The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Perú. Vol 1. Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires.
- JORGE, R., E. TABILO-VALDIVIESO Y V. MONDACA. 1988. Avifauna de la laguna de Punta Teatinos y ecosistemas adyacentes, bahía de Coquimbo, Chile. Boletín Chileno de Ornitología 5:2-9.
- KLEMENS, S. 1997. The first dowitcher *Limnodromus* sp. in Chile. Cotinga 8:90-91.
- MARTÍNEZ, D. 1988. Algunas observaciones especiales. Boletín Informativo UNORCH 6:5.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1970. A guide to the birds of South América. Livingston Publishing Company, Wynnewood, Pennsylvania.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1982. A guide to the birds of South América. The International Council for Bird Preservation, Philadelphia.
- PHILIPPI, R. A., 1936. Nuevas especies que deben agregarse a la lista de aves Chilenas. Boletín Museo Nacional de Historia Natural Santiago 15:15-20.
- PHILIPPI, R. A. 1951. Observaciones sobre aves norte-americanas migratorias que visitan Chile. Boletín Museo Nacional de Historia Natural Santiago 25:79-84.
- PHILIPPI, R. A. 1964. Catálogo de aves Chilenas con su distribución geográfica. Investigaciones Zoológicas Chilenas 11:1-179.

32 CONTRIBUCIONES BREVES

- SCHLATTER, R. 1992. Observaciones de aves en el Norte Chico. Boletín Informativo UNORCH 13:7-8.
- VUILLEUMIER, F. 1995. Boreal migrant birds in southern South America: distribution, abundance, and ecological impact on Neotropical breeding species. Ecotropica 1:99-145.
- VUILLEUMIER, F. 1997. A probable Short-billed Dowitcher (*Limnodromus griseus*, Scolopacidae) at Tongoy, IV región: first record of the genus and species for Chile?. Boletín Chileno de Ornitología 4:21-28.

Boletín Chileno de Ornitología 6: 32 - 33
Unión de Ornitólogos de Chile 1999

DEPREDACION DEL MERO *Agriornis livida* (PASSERIFORMES: TYRANNIDAE), SOBRE LA LAUCHA DE PELO LARGO, *Akodon longipilis*

HERNÁN COFRÉ¹ Y YERKO A. VILINA²

¹ Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Casilla 114-D, Santiago, Chile,
Correo e: hcofre@genes.bio.puc.cl

² Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Santo Tomás. Ejercito 146, Santiago, Chile
Correo e: yerko.vilina@geotecnica.cl

El género *Agriornis* (Familia Tyrannidae) incluye cinco especies de cazamoscas que se caracterizan por su gran tamaño (entre 18 y 27 cm), su postura erecta y su pico fuerte y ganchudo (Fjeldsá y Krabbe 1990, Araya *et al.* 1996).

En general, este grupo prefiere ambientes xéricos, habitando principalmente en lugares abiertos en los Andes y la Patagonia (Fjeldsá y Krabbe 1990, Ridgely y Tudor 1994).

En la tarde del 22 de diciembre de 1996, en un sector precordillerano, ubicado en la cuenca del río Choapa y cercano a la localidad de Salamanca (IV Región, 2.400 m.s.n.m.), se observó un individuo de Mero (*Agriornis livida*) parado sobre una roca alimentándose de una presa. El ambiente correspondía a un sector de vegas asociadas al río Los Pelambres. Al observarlo detenidamente, se pudo constatar que esta presa era un roedor, que el ave llevaba en su pico. Luego de un momento y al ser perseguido por nosotros, el Mero soltó su presa. Al observarla de cerca se pudo apreciar que el roedor no presentaba cabeza y que la parte anterior del cuerpo se encontraba sin pelos. Sólo la parte posterior del vientre y las extremidades traseras presentaban pelaje, el que por su coloración, largo y textura se asemejaba al de una laucha de pelo largo (*Akodon longipilis*). Por el tamaño del individuo es probable que se tratara de un individuo juvenil. El roedor aún no se encontraba ni rígido, ni frío y presentaba sangre fresca, por lo que suponemos que su captura había sido reciente. Esta información sugiere que esta ave incluye en su dieta pequeños mamíferos, los que muy probablemente obtiene cazando activamente.

Los datos disponibles en la literatura sobre la dieta de ésta y otras especies congénéricas son en general escasos. Goodall *et al.* (1946) documenta que *A. livida* se alimenta en parte de insectos, pero también de reptiles, sapos, huevos o polluelos e incluso de pequeños mamíferos, como la laucha silvestre, lo que concuerda con nuestra observación. Por otra parte, la literatura reciente sólo documenta información anecdótica de depredación del mero común sobre el picaflor chico (*Sephanoides sephanioides*) (Martínez del Río 1992) y sobre el cachudito (*Anairetes parulus*) (Ridgely y Tudor 1994). Además, se han descrito ataques de depredación del mero común sobre el gorrión (*Passer domesticus*), pero sin evidenciar captura (Núñez 1995). La falta de estudios sistemáticos sobre los hábitos tróficos de esta especie, no permite saber con certeza cual es la proporción de presas que corresponden a vertebrados endotermos dentro su dieta. No obstante, no parece tan difícil que uno de estos tiránidos, que puede alcanzar un peso de 100 g (Humphrey *et al.* 1970), incluya en su dieta aves y roedores que pesan menos de 20 g, como es el caso de un juvenil de *Akodon longipilis*.

LITERATURA CITADA.

- ARAYA B., G. MILLIE Y M. BERNAL. 1996. Guía de campo de las Aves de Chile. Editorial Universitaria, Santiago.
- GOODALL, J. D., A. W. JOHNSON Y R. A. PHILIPPI. 1946. Las Aves de Chile. Vol. I. Platt. Establecimientos Gráficos, Buenos Aires.
- GOODALL, J. D., A. W. JOHNSON Y R. A. PHILIPPI. 1964. Suplemento de las Aves de Chile. Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires.
- FJELDSÁ, J. Y N. KRABBE. 1990. Birds of the high Andes. Zoological Museum, University of Copenhagen y Apollo Books, Svendborg.