

NOTAS CORTAS

***Catharacta lonnbergi* en el estero El Yali.** El día 30 de marzo de 1996 se registró una pareja de Salteador Pardo (*Catharacta lonnbergi*) en la laguna costera de la desembocadura del estero El Yali (33°47'S, 71°23'W) Región de Valparaíso. No existen registros fotográficos. Jose Luis Brito (museo_jmsa@hotmail.com), Museo Municipal de Cs. Naturales y Arqueología de San Antonio, Casilla 93, Llole, San Antonio.

Observaciones de *Burhinus superciliaris* en la Región de Tarapacá. Se presenta una serie de avistamientos de Chorlo Cabezón (*Burhinus superciliaris*) en distintas localidades cercanas a la ciudad de Arica, Región de Tarapacá. En octubre de 1997 se encontraron dos adultos y dos pollos en la desembocadura del río Lluta (18°25'S, 70°20'W). En enero de 1999 se observó una pareja de adultos en el valle del río Lluta (cerca puente Sta. Lucía), y una pareja en la desembocadura del mismo río. En abril de 1999 se observó un adulto frente al club hípico de la ciudad de Arica (18°28'S 70°20'W). El 26 de diciembre de 1999 se observaron tres adultos en la desembocadura del río Lluta en actitud que sugería actividad reproductiva aunque ésta no fue verificada. A partir de enero de 2000 se observó un adulto en varias oportunidades en las cercanías del club hípico, hasta que el 4 de febrero se encontró a la pareja junto con un pollo. El 8 de febrero la cría fue observada atropellada en el camino que conduce a la playa. En julio de 2000 se observó una pareja a la altura del km 15 del valle de Azapa. Existen fotografías de varios ejemplares en poder de la primera autora. Loreto Miranda Salinas^{1,4}, Jorge Herreros de Lartundo^{2,4} & Barbara Knapton³. ¹Departamento Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Casilla 121 Iquique, Chile. ²Corporación Nacional Forestal, Patrimonio Silvestre, Vicuña Mackenna 820, Arica. ³Birding Altoandino, Correo de Putre, Putre, I Región de Tarapacá. ⁴Grupo de Estudios Ornitológicos (GEO).

***Phalacrocorax gaimardi* en el estrecho de Magallanes.** El día 7 de mayo de 1998 se observaron dos ejemplares de Lile (*Phalacrocorax gaimardi*) en la localidad de San Gregorio (52°34'S 70°04'W) en el Estrecho de Magallanes. La última observación de la especie para la región de Magallanes data de 1971. No existen registros fotográficos de la observación. Santiago Imberti (imbartis@ar.inter.net), Rivadavia 780, 9400 Río Gallegos, Argentina.

***Egretta caerulea* en la Región de Tarapacá.** El día el 21 de septiembre de 1999 se observó un adulto y un juvenil de Garza Azul (*Egretta caerulea*) en la Península del Alacrán, Arica (18°30'S, 70°25'W). Posteriormente (23 septiembre) se observó un tercer individuo juvenil en el Lago Chungará (18°07'S, 69°12'W) a 4600 m.s.n.m. No se obtuvieron registros fotográficos. Santiago Imberti (imbartis@ar.inter.net), Rivadavia 780, 9400 Río Gallegos, Argentina.

***Larus pipixcan* en Puerto Natales.** El día 18 de febrero de 2000 se observó un individuo de Gaviota de Franklin (*Larus pipixcan*) alimentándose en las cercanías de la ciudad de Puerto Natales (51°33'S, 72°27'W), Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes. No existen registros fotográficos. Santiago Imberti (imbartis@ar.inter.net), Rivadavia 780, 9400 Río Gallegos, Argentina.

***Numenius phaeopus* en lago Yulton, Provincia de Aisén.** A mediados del mes de junio de 2000 se observó un individuo de Zarapito (*Numenius phaeopus*) en el lago Yulton (45°08'S, 72°54'W), ubicado en la Cordillera de Los Andes, al noroeste de Puerto Aisén. No existen registros fotográficos. Juan Pablo Gabella (jpgabella@hotmail.com). Unión de Ornítólogos de Chile, Casilla 13.183, Santiago-21.

***Pseudocolopteryx flaviventris* en laguna Santa Elena, Provincia de Ñuble.** El día 28 de enero de 2001 se capturó con una red de niebla un individuo de Pájaro Amarillo (*Pseudocolopteryx flaviventris*) en la laguna Santa Elena (36°48'S, 72°22'W), Provincia de Ñuble. El individuo era juvenil por lo que es posible que la especie nidifique en el área. Este es el registro más austral de pájaro amarillo en los últimos años. Existen fotografías en poder del primer autor. Daniel González Acuña¹ (danigonz@udec.cl), José Cabello Cabalin¹, Eberhard Mey², Ignacio Fernández Latapiat¹ & Andrea Cortez Bacigalupo¹. ¹Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Concepción, Casilla 537, Chillán, Chile. ²Naturhistorisches Museum im Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, Schloßbezirk 1, D- 07407 Rudolstadt, Alemania.

***Ajaia ajaja* en la Región de Valparaíso.** El día 27 de febrero de 2001 se registró un individuo de Espátula (*Ajaia ajaja*) en el Tranque Laguna de Catapilco (32°28'S 71°38'W), Provincia de Petorca. Previamente existían algunos registros entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins, incluyendo su nidificación en esta última. Existen fotografías en poder de los autores. Ver Figura 1. Juan Aguirre (juan_aguirre2@hotmail.com) & Mónica Rubio, Unión de Ornitólogos de Chile, Casilla 13.183, Santiago 21.



Figura 1. *Ajaia ajaja* (derecha) junto con un ejemplar de *Casmerodius albus* (izquierda). Tranque de Catapilco.

***Vanellus chilensis* en Antofagasta.** El día 27 de octubre de 2001 se observó un ejemplar de Queltehue (*Vanellus chilensis*) en el césped de la avenida Costanera, en la entrada sur de Antofagasta (23°38'S, 70°24'W). Esta observación extiende la distribución norte de la especie que era Caldera (Región de Atacama, 27°04'S, 70°49'W). Al parecer la distribución del queltehue se está extendiendo. No existen registros fotográficos. Juan Carlos Torres-Mura (jtorres@mnhn.cl), Museo Nacional de Historia Natural, Casilla 787, Santiago.