

FE DE ERRATAS

Por un error de edición, en el número 7 del Boletín el cuadro del artículo de Figueroa *et al.* (páginas 11 y 12) fue impreso con una leyenda equivocada. A continuación se presenta el cuadro en su versión correcta.

Tabla 1. Riqueza y abundancia de especies de aves por ambiente durante la primavera de 1996 y verano de 1997 en el S. N. Los Huemules del Niblinto, Andes de Chillán, VIII Región, Chile. CR = bosque de coihue oble, MR = matorral abierto con renoval de coihue, LP = bosque de lenga achaparrado, MA = matorral de altura, RN = río Niblinto y sus bordes. Las especies registradas después de marzo de 1997 se indican en subrayado. Ver = verano, Pri = primavera, Tot = total.

Especies	CR ^z			MR ^{cl}	LP ^{cp}	MA ^{cl}	RN ^{cl}
	Pri	Ver	Tot	Pri	Pri	Pri	Pri
Huairavo (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	-	-	-	-	-	-	1,7
<u>Canquén</u> (<i>Chloephaga poliocephala</i>) ^a							
Pato cortacorriente (<i>Merganetta armata</i>)							+
Cóndor (<i>Vultur gryphus</i>) ^v							
<u>Jote cabeza negra</u> (<i>Coragyps atratus</i>) ^{a, v}							
Peuquito (<i>Accipiter bicolor</i>)	2,2	-	1,1	3,1	-	-	-
Aguilucho común (<i>Buteo polyosoma</i>)	+	5,6	2,8	1,0	-	4,5	1,7
<u>Aguilucho chico</u> (<i>Buteo albigula</i>) ^{b, c}							
<u>Peuco</u> (<i>Parabuteo unicinctus</i>) ^{d, v}							
<u>Vari huevetero</u> (<i>Circus buffoni</i>) ^{c, e}							
<u>Aguila</u> (<i>Geranoaetus melanoleucus</i>) ^{c, v}							
<u>Carancho cordillerano</u> (<i>Phalcoboenus megalopterus</i>) ^{c, z}							
Traro (<i>Polyborus plancus</i>)	1,1	-	0,6	-	-	-	-
<u>Tiuque</u> (<i>Milvago chimango</i>) ^{b, g, v}							
<u>Halcón perdiguero</u> (<i>Falco femoralis</i>) ^{c, v}							
<u>Pidén</u> (<i>Rallus sanguinolentus</i>) ^{h, i}							
<u>Treile</u> (<i>Vanellus chilensis</i>) ^k							
<u>Perdicita cordillerana</u> (<i>Attagis gayi</i>) ^{h, i}							
<u>Gaviota andina</u> (<i>Larus serranus</i>) ^a							
Torcaza (<i>Columba araucana</i>)	1,1	1,9	1,5	-	-	-	-
<u>Tórtola cordillerana</u> (<i>Metriopelia melanoptera</i>) ^k							
Cachaña (<i>Enicognathus ferrugineus</i>)	6,5	7,5	7,0	9,1	-	-	-
<u>Tucúquere</u> (<i>Bubo virginianus</i>) ^{b, c}							
Chuncho (<i>Glaucidium nanum</i>)	1,1	1,9	1,5	-	-	-	-
Concón (<i>Strix rufipes</i>)	1,1	1,9	1,5	-	-	-	-
<u>Gallina ciega</u> (<i>Caprimulgus longirostris</i>) ^k							
Picaflor gigante (<i>Patagonas gigas</i>)	1,1	-	0,6	-	-	-	-
<u>Picaflor cordillerano</u> (<i>Oreotrochilus leucopleurus</i>) ^{c, z, z}							
Picaflor chico (<i>Sephanoides galeritus</i>)	5,4	15,1	10,2	4,1	10,5	2,2	7,0
<u>Martín pescador</u> (<i>Ceryle torquata</i>) ^j							
Carpinterito (<i>Picoides lignarius</i>)	-	1,9	0,9	-	-	-	-
Pitío (<i>Colaptes pitius</i>)	4,3	1,9	3,1	5,1	-	4,5	-

Tabla 1. Continuación

Carpintero Grande (<i>Campephilus magellanicus</i>)	4,3	1,9	3,1	-	-	-	-
<u>Bandurrilla</u> (<i>Upucerthia dumetaria</i>) ^k							
Churrete acanelado (<i>Cinclodes fuscus</i>)	-	-	-	-	-	4,5	-
Churrete común (<i>Cinclodes patagonicus</i>)	-	-	-	-	-	-	3,4
Rayadito (<i>Aphrastura spinicauda</i>)	13,0	13,2	13,1	6,1	15,8	11,4	20,6
Colilarga (<i>Sylviorhynchus desmursii</i>)	-	+	+	2,0	-	4,5	-
Tijeral (<i>Leptasthenura aegithaloides</i>)	-	-	-	4,1	-	7,0	-
Comesebo (<i>Pygarrichas albogularis</i>)	8,7	7,5	8,1	-	-	-	7,0
<u>Turca</u> (<i>Pteroptochos megapodius</i>) ^{i,1}							
<u>Hued-hued del sur</u> (<i>Pteroptochos tarnii</i>) ^g							
Hued-hued castaño (<i>Pteroptochos castaneus</i>)	1,1	5,6	3,4	-	-	-	-
Chucazo (<i>Scelorchilus rubecula</i>)	4,3	7,5	5,9	-	5,3	-	-
Churrín (<i>Scytalopus magellanicus</i>)	2,2	1,9	2,0	2,0	10,5	-	-
<u>Mero</u> (<i>Agrionis livida</i>) ^h							
Diucón (<i>Xolmis pyrope</i>)	-	-	-	2,0	-	4,5	-
Dormilona fraile (<i>Muscisaxicola flavinucha</i>)	-	-	-	-	-	2,2	-
Dormilona rufa (<i>Muscisaxicola capistrata</i>)	-	-	-	-	-	4,5	-
Colegial (<i>Lessonia rufa</i>)	-	-	-	-	-	4,5	-
Fío fío (<i>Elaenia albiceps</i>)	17,4	5,6	11,5	6,1	10,5	7,0	15,5
Cachudito (<i>Anairetes parulus</i>)	-	-	-	2,0	5,2	-	-
Viudita (<i>Coloramphus parvirostris</i>)	1,1	5,6	3,4	-	-	-	-
Golondrina chilena (<i>Tachycineta meyeni</i>)	4,3	1,9	3,1	8,2	-	-	27,5
Golondrina dorso negro (<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>)	-	-	-	4,1	15,8	9,0	8,6
Chercán (<i>Troglodytes aedon</i>)	4,3	1,9	3,1	9,2	-	4,5	-
Zorzal (<i>Turdus falcklandii</i>)	5,4	6,0	5,7	3,1	10,5	-	7,0
Chincol (<i>Zonotrichia capensis</i>)	1,1	-	0,6	6,1	-	7,0	-
Tordo (<i>Curaeus curaeus</i>)	2,2	-	1,1	7,1	5,3	-	-
Cometocino (<i>Phrygilus patagonicus</i>)	4,3	1,9	3,1	2,0	10,5	9,0	-
<u>Cometocino de Gay</u> (<i>Phrygilus gayi</i>) ^{c, b}							
Yal cordillerano (<i>Melanodera xanthogramma</i>)	-	-	-	-	-	2,2	-
Jilguero (<i>Carduelis barbata</i>)	2,2	1,9	2,0	13,3	-	7,0	-
Total especies	25	22	27	20	10	18	11
Total familias	15	13	15	12	8	9	8
Total órdenes	7	7	7	5	2	4	5
Total de individuos	92	53	145	98	20	43	58
Diversidad (H')	3,5	2,8	3,5	3,2	2,2	2,0	2,0

^a Estimaciones por conteos puntuales, ^d Estimaciones por conteos lineales

+ Detectado fuera de los conteos

^a laguna El Baúl (1800 msnm), ^b bosque de Nothofagus (1500 - 1800 msnm), río Niblinto, ^c Cerro El Baúl, ^d Valle Niblinto, ^e matorral de Chusquea, ^f salientes rocosos, ^g bosque Nothofagus (1800 msnm), ^h bosque-matorral de ñirre-lenga, Cerro El Colchón (1800 msnm), ⁱ esteros Cerro El Colchón (1400 msnm), ^j estero Las Yeguas, ^k matorral abierto Nothofagus-coironales en planicies altas (ca 2000 msnm), sector río Cato, ^l valle El Baúl; ^v avistados en vuelo.