28 CONTRIBUCIONES BREVES

y la nidificación entre la VI y VII regiones, en bosques del tipo Caducifolio de la montaña (Gajardo 1994), indican que alguna proporción de la población se comportaría como residente en la zona central de Chile, ocupando quebradas con bosques nativos densos. La población sureña podría migrar a la zona central durante el invierno (Goodall *et al.* 1951). Housse (1945) describe que las parejas adultas que ocupan quebradas de la zona central con refugio y oferta de alimento permanente, pueden residir aquí todo el año.

LITERATURA CITADA

- ARAYA, B.; G. MILLIE Y M. BERNAL. 1996. Guía de campo de las aves de Chile. Sexta edición. Ed. Universitaria, Santiago.
- BROWN, L. Y D. AMADON. 1968. Eagles, Hawks and Falcons of the World. Country Life Books, Feltham.
- DE LA PEÑA, M. 1992. Guía de aves argentinas. Literature of Latin America. Tomo II, Buenos Aires.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago.
- GOODALL, J.D., A.W. JOHNSON Y R.A. PHILIPPI. 1951. Las aves de Chile: su conocimiento y sus costumbres. Vol. 2. Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires.
- HOUSSE, R. 1945. Las aves de Chile en su clasificación moderna. Ed. Universidad de Chile, Santiago.
- TALA, C. Y J. MUSSA. 1995. Observación de peuquito (*Accipter bicolor chilensis*, Philippi y Landbeck, 1864) en el Parque Nacional Fray Jorge, IV Región. Boletín Chileno de Ornitología. 2: 24-25

Boletín Chileno de Ornitología 5: 28 - 29.
Unión de Ornítólogos de Chile 1998

OBSERVACIONES ORNITOLÓGICAS EN EL MONUMENTO NATURAL LAGUNA DE LOS CISNES, TIERRA DEL FUEGO: NUEVO REGISTRO DE PIMPOLLO TOBIANO (*Podiceps gallardoii*) EN CHILE

PAUL ST. PIERRE Y MALCOM DAVIES

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) Warden, exe Estuary, Devon, UK. FAX: 0044 1392 833632.

Durante nuestra visita a Chile con la ayuda de Birdlife International, el 5 de febrero de 1997 pudimos visitar, entre otros, el Monumento Natural Laguna de Los Cisnes, ubicado cerca de Porvenir en Tierra del Fuego (XII Región). Pudimos reconocer en el sitio un área amplia de aguas abiertas rodeadas por fango salino en proceso de desecación. A lo largo de esas riberas se pudo reconocer parejas de chorlos de Magallanes (*Pluvianellus socialis*) y grupos reducidos de playero de Baird (*Calidris bairdii*). En las aguas poco profundas cercanas a la playa se observaron flamencos chilenos (*Phoenicopterus chilensis*) alimentándose y en descanso; el número total contabilizado fue alrededor de 1.400 ejemplares. En el agua, al interior del lago contabilizamos una serie de especies de aves, incluyendo un grupo de 2.200 blanquillos (*Podiceps occipitalis*), agregados todos en un área del cuerpo de agua. Más cercano a las riberas, también se observó un gran número de pollito de mar de Wilson (*Steganopus tricolor*). Un conteo absoluto fue imposible, pero cuando un halcón peregrino (*Falco peregrinus*) se acercó al lago en vuelo rasante, se estimó una población de 5.000 individuos en vuelo de huida.

Al observar con cuidado el grupo de blanquillos, descubrimos entre estos a un solo ejemplar de pimpollo tobianio (*Podiceps gallardoii*). El ejemplar era de similar tamaño al blanquillo y se reconoció por su pico oscuro, área blanca cerca del ojo y amarillo-anaranjado hacia lo alto de la cabeza, más brillante en la parte posterior. Presentaba la característica área negra bajo el pico y bajo el ojo, que se extiende posteriormente hacia la parte alta de la cabeza. La garganta y el pecho eran blancos.

También se observó una delgada línea negra que recorre la parte posterior de la nuca, las alas y la espalda oscura, los flancos pálidos. Las características de la cabeza fueron especialmente notorias y confirmadas no sólo con binoculares sino con un telescopio.

Respecto de la presencia de *Podiceps gallardoi* en Chile, Fjeldså y Krabbe (1990) sostienen que es casual cerca del "Payne", Magallanes [SIC]; y Pearman (1995) menciona que hay varias observaciones hechas en el período 1989-1991, en el Parque Nacional Torres del Paine y un lago cercano. Sin embargo, esta especie no fue incorporada en la Lista Patrón de Araya *et al.* (1995). La presente observación, la primera en Tierra del Fuego, amplía los lugares donde se ha encontrado a esta rara ave.

Agradecemos al Dr. Roberto Schlatter por llamarnos la atención sobre este hallazgo y por la traducción de esta nota.

LITERATURA CITADA

- ARAYA, B., M. BERNAL, R. SCHLATTER Y M. SALLABERRY. 1995. Lista Patrón de las Aves Chilenas. Editorial Universitaria, Santiago.
- FJELDSÅ, J. Y N. KRABBE. 1990. Birds of the high Andes. Zoological Museum, University of Copenhagen and Apollo Books, Svendborg.
- PEARMAN, M. 1995. The essential guide to birding in Chile. Worldwide Publications, Derbyshire.

Boletín Chileno de Ornitología 5: 29 - 30.
Unión de Ornítólogos de Chile 1998

REGISTRO DE PATO SILBÓN DE ALA BLANCA (*Dendrocygna autumnalis*) EN CHILE CENTRAL

MARIANO BERNAL¹, HOMERO GALLARDO², JUAN LEIVA², IGNACIO MIRANDA² Y ALEJANDRO SIMEONE²

¹ Instituto de Oceanología, Universidad de Valparaíso. Casilla 13-D, Viña del Mar (mbernal@uv.cl).

² Corporación Nacional Forestal, V Región

El 17 de febrero de 1998, mientras se realizaba el censo estival de aves acuáticas (organizado por UNORCH y Wetlands International) en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, V Región (33°07'S; 71°24'W), se observó en el sector "Paso del Agua" de dicha unidad, un ejemplar adulto de pato silbón de ala blanca (*Dendrocygna autumnalis*). El ejemplar se encontraba posado en una ensenada de aguas someras junto a una bandada conformada por 46 patos reales (*Anas sibilatrix*) y 50 taguas (*Fulica armillata*).

Esta especie fue registrada por primera vez en Chile por Ruiz (1994) en las cercanías de Osorno, X Región (40°S). En esta especie se reconocen dos subespecies, una en norte y centro América y otra en Sudamérica, de las cuales, *D. a. fulgens*, es la más probable de encontrarse en Chile por estar distribuida desde Panamá, hasta el sur de Ecuador por el oeste y norte de Argentina por el este (del Hoyo *et al.* 1992). Habitante de esteros, lagunas, pantanos, áreas inundadas y sus bosques circundantes, este pato está ampliamente distribuido en las zonas tropicales de América y ocasionalmente visita zonas más temperadas en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Fjeldså y Krabbe 1990). En Argentina y Uruguay sólo se encuentra en las regiones más septentrionales (Narosky y Yzurieta 1993).

Este nuevo registro constituye otra observación fuera de su rango de distribución conocido y probablemente apoye la idea de una expansión hacia el sur (Ruiz 1994), aunque existe la posibilidad de que el ejemplar avistado haya escapado de algún criadero, ya que esta especie es mantenida en cautiverio en nuestro país.