

al sitio de la observación, podría pensarse que el ejemplar avistado correspondería a la subespecie *P. m. murphy*. El ejemplar fue observado a las 11 hrs. del día 20 de febrero de 1996 y, la coloración general café grisácea indicaría que se trataba de un ejemplar juvenil o de una hembra.

#### LITERATURA CITADA

- ARAYA, B. Y S. CHESTER. 1993. The birds of Chile. Latour, Santiago.
- FJELDSA, J. Y N. KRABBE. 1990. The birds of high Andes. Ed. Apollo Books, Svendborg, Dinamarca.
- GONZÁLEZ, C. 1988. Una rica avifauna en el desierto transformado por el hombre. Boletín Informativo UNORCH 5: 14-26.
- GOODALL, J.D.; A.W. JONHSON Y R.A. PHILIPPI. 1957. Las aves de Chile, Tomo 2. Platt Est. Gráficos S.A., Buenos Aires.
- NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 1989. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Vazquez Mazzini Editores. Buenos Aires.

Boletín Chileno de Ornitología 3: 40  
Unión de Ornítólogos de Chile 1996

### GOLONDRINA BARRANQUERA (*Riparia riparia*) EN CUCAO, CHILOE.

ANDREAS VON MEYER Y LUIS ESPINOSA.

Unión de Ornítólogos de Chile, casilla 711, Puerto Montt.

El 8 de diciembre de 1995, durante un curso de ornitología para guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), organizado por la Unión de Ornítólogos de Chile (UNORCH) y el Instituto de Estudios Ecológicos de Chiloé (IEECH) en la localidad de Cucao, Isla Grande de Chiloé, observamos un ejemplar de esta especie en una laguna costera distante aproximadamente a dos kilómetros del centro de informaciones de CONAF.

Cuando no volaba, se posaba siempre en el mismo poste semisumergido en la laguna. El ejemplar estaba en compañía de varias decenas, tanto de *Tachycineta meyeri* (golondrina chilena) como de *Notiochelidon cyanoleuca* (golondrina de dorso negro), las golondrinas más comunes de nuestro país. Al parecer se trataba de un ejemplar adulto, pues no presentaba el característico plumaje moteado de los juveniles (Jonsson 1993).

Una especie similar, *Phaeoprogne tapera*, la golondrina parda grande, residente de Argentina y posible visitante en nuestro país (Gerry Clark, com. pers.) presenta plumaje parecido, pero es mucho mayor en tamaño.

La ocurrencia de *Riparia riparia* en Chile ha sido revizada recientemente por Aguirre (1992). También ha sido observada por uno de los autores en la localidad de Petrohué, provincia de Llanquihue. Este sería el tercer registro de la especie para la décima región.

#### LITERATURA CITADA

- JONSSON, L. 1993. Die Voegels Europas und des Mittelmeerraumes. Franckh Kosmos, Stuttgart.
- AGUIRRE, J. 1992. Las golondrinas de Chile. Boletín Informativo UNORCH, 14: 18 - 19.