BOLETIN ORNITOLOGICO

PUBLICADO POR EL COMITE DE CIENCIA DEL INSTITUTO
CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA

CASILLA 9286 – MONEDA 1467 – TELEFONO 63215, ANEXO 38
SANTIAGO – CHILE

CISNE DE CUELLO NEGRO

Esta especie (Cygnus melancoryphus) se distribuye en Chile desde Coquimbo a Magallanes, siendo que en esta última región donde se encuentra en mayor cantidad. Además, también vive en otros países como ser Argentina, Uruguay y la parte meridional de Brasil.

DICIEMBRE 1978

AÑO X Nos 1 y 2

Este Boletín es editado por el Comité de Ciencias del Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura y fue fundado en Abril de 1969 por Berton M. Bailey, Director de esta Institución (1965-1969).

COMITE EDITOR

Patricio Drouilly L. — Area Ciencia y Tecnología, Sede Regional del Maule, U.C., Talca.

Roberto P. Schlatter — Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile. Casilla 567 - Valdivia.

Jürgen Rottmann S. — Corporación Nacional Forestal Av. Bulnes 285. Of. 401 - Stgo.

CONTENIDO

Roberto P. Schlatter — Aves observadas en Sierra de Bellavista, Prov. de Colchagua .. 3

Patricio Droully y J. Ibarra — Presencia y reproducción de patos (Anseriformes) en la Reserva Forestal Lago Peñuelas, Valparaíso, durante 1976. ... 6

Emilio Loo — Anotaciones acerca de la gaviota migratoria Larus pipixcan WAGLER (Charadriiformes-Laridae), en el Departamento de Arica. ... 9

NOTAS BREVES

J. González y L. Gómez — Nidificación de la Dormilona de Nuca Castaña (Muscisaxicola albilora Lafresnaye). ... 10

Javier González — Acerca de la distribución altitudinal de Fulica armilleta Vieillot. . 11

O. Doering y R. P. Schlatter — Pato gargantillo en Valdivia ... 12

R. P. Schlatter — Ampliación de distribución longitudinal del Bailarín y Hallazgo de la tagua de Frente Roja en Valdivia. ... 12

A NUESTROS COLABORADORES

Las contribuciones al Boletín Ornitológico, pueden ser enviadas al Comité de Ciencias del Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura, Casilla 9286, Santiago o directamente a los miembros del Comité de Publicaciones.

Aves observadas en Sierra de Bellavista, provincia de Colchagua.

Roberto P. Schlatter
Instituto de Zoología
Universidad Austral de Chile
Valdivia.

El balneario pre-cordillerano, Sierra de Bellavista, está situado aproximadamente a 43 kms. al este de la ciudad de San Fernando, y a una altura de 1.050 msnm. Se encuentra rodeado de bosque esclerófilo y arbustos precordilleranos. La intervención del hombre ha afectado dicho lugar bastante, especialmente por explotación e incendios.

Aún existen bosques de Roble blanco (Nothofagus oblicua var. macrocarpa) y rara vez se divisan grupos de Ciprés de la Cordillera (austrocedrus chilensis).

Se ha reforestado ciertos sectores del balneario con Pino insigne, que ya en la época de este estudio era explotable. El balneario mismo posee un embalse pequeño, rodeado de pinos; al norte está limitado por una profunda quebrada en el cual hace su recorrido el Río Claro y al sur por laderas de cerros que alcanzan una altura de 2000 metros o más. En la quebrada, a ambos lados del río, se pudo observar sectores de cultivo y de explotación carbonera. La mayor parte de los terrenos incendiados no reforestados han sido invadidos por coligues y mosqueto y en menor escala por zarzamora. Las observaciones se efectuaron entre el 4 y 14 de Febrero de 1973.

Las aves observadas en los diversos ambientes, desde el río y quebrada, hasta cierta altura sobre el pueblo, fueron:

Podicipediformes
1) Picurio, Podilymbus podiceps antarcticus

Ciconiiformes
2) Huairavo, Nycticorax nycticorax obscurus
3) Bandurria, Theristicus caudatus melanopis

Anseriformes
4) Pato jergón grande, Anas georgica spinicauda
5) Pato anteojillo, Anas sp. specularoides
6) Pato correntino, Merganetta a. armata

Falconiformes
7) Cóndor, Vultur gryphus
8) Aguila, Buteo fuscescens australis
9) Aguilucho común, Buteo p.polyosoma

Galliformes
10) Codorniz, Lophortyx californica brunnescens
11) Tagüita común, Porphyriops melanops crassirostris

Columbiformes
12) Torcaza, Columba araucana
13) Tórtola común, Zenaida a. auriculata

Psittaciformes
14) Loro Tricagüe, Cyanoliseus patagonicus byroni
15) Cachaña, Microsittace ferruginea minor

Strigiformes
16) Lechuza blanca, Tyto alba tuidara

Apodiformes
17) Picaflor chico común, Sephanoides sephaniodes
18) Picaflor gigante, Patagona g. gigas

Piciformes
19) Carpintero negro, Campephilus magellanicus
20) Carpintero chico, Dendrocopos lignarius
21) Pitigüe, Colaptes pitius pitius

Passeriformes
22) Minero común, Geositta cunicularia fissirostris
23) Bandurrilla de la cordillera, Upucerthia dumetaria hypoleuca
24) Churrete común, Cinclodes patagonicus chilensis
25) Churrete acanelado, Cinclodes f. fuscus
26) Rayadito común, Aphrastura sp. spinicauda
27) Tijeral común, Leptasthenura ae. aegithaloides
28) Comesebo grande, Pygarrhichas albogularis
29) Turca común, Pteroptochos m. megapodius
30) Huet-Huet castaño, Pteroptochos (tarnii) castaneus
31) Tapaculo común, Scelorchilus a. albicollis
32) Diucón, Pyrope p.pyrope
33) Fío-Fío, Elaenia a. albiceps
34) Cachudito, Anaeretes p. parulus
35) Rara, Phytotoma rara
36) Golondrina de Rabadilla blanca, Tachycineta leucopyga
37) Golondrina de Rabadilla negra, Notiochelidon cyanoleuca patagonica
38) Chercán común, Troglodytes aedon chilensis
39) Tenca común, Mimus thenca
40) Zorzal común, Turdus falklandii magellanicus
41) Mirlo argentino, Molothrus b. bonariensis
42) Tordo común, Curaeus c. curaeus
43) Loica, Pezites m. militaris
44) Gorrión, Passer domesticus
45) Jilguero común, Spinus barbatus
46) Chirigüe común, Sicalis luteola luteiventris
47) Diuca común, Diuca d. diuca
48) Fringilo cordillerano, Phrygilus g. gayi
49) Chincol común, Zonotrichia capensis chilensis

Importante es hacer resaltar mayores antecedentes de algunas de las 49 especies listadas.

El carpintero grande ha sido escuchado claramente con su fuerte martilleo en las laderas de los cerros colindantes al sur de balneario por el Sr. Carlos Mira (com. pers.). Según éste,en el pasado incluso se hicieron pieles de dichas aves por algunos lugareños. La descripción hecha por el Sr. Mira no deja dudas sobre la especie. Esto indicaría que la distribución geográfica de este gran carpintero - en franca disminución numérica en la zona central - se extiende más al norte de lo indicado por Johnson (1967). Es decir, podemos decir con cierta seguridad que el carpintero grande se distribuye desde los Andes de Colchagua hasta Tierra del Fuego.

Aún cuando no observados durante Febrero de 1973, cóndores, loros tricagües, cachañas y loicas suelen visitar el lugar en otras épocas del año (Sr. H. Spethmann y Carlos Mira, com. pers.)

Al recorrer el lugar hacia San Fernando en automóvil, en una curva saltó y corrió al camino una turca, pero de tonos bastante oscuros y sin observarse partes claras en vientre y cabeza. El ejemplar podría corresponder a la especie Pteroptochos (tarnii) castaneus, Philippi y Landbech.

El ejemplar de pato anteojillo fue encontrado sobre una rama baja de un pino podado y cerca del embalse en estado de momificación. Seguramente fué cazado en otra época y cayó herido de muerte en tal lugar.

Una pareja de aguiluchos comunes, más un crío, revoloteaban sobre un bosque de pino con gritos insistentes que se escuchaban en el valle del balneario. Al observarlos con detención, se notó que se posaban con particular frecuencia en un pino. Al observar éste con binoculares, se reconoció lo que podría ser un nido. Después de subir 15m. por el pino, se alcanzó el nido, construído por palos, fuertemente cubierto por fecas y con restos de solo dos regurgitados. Esto indica que el aguilucho común nidifica en el lugar.

Dos grupos de codornices fueron observadas, ambas completando hasta 27 individuos, con gran cantidad de críos ya capaces de volar. Se escondían especialmente bajo mora o restos de ramas de pino secas en claros húmedos y cerca de riachuelos. Esta especie nidifica en el lugar.

El día 10 de Febrero fue observado en la tarde una pareja de pato cortacorrientes sobre una piedra sobresaliente en medio del río. Muy tímidos huyeron contra la corriente hacia la cordillera.

Golondrinas de Rabadilla negra y blanca, son los depredadores más importantes de los diminutos insectos que vuelan en recodos sobre el río. Pero también se observó en por lo menos dos oportunidades a picaflores gigantes revolotear en esos sectores y hacer movimientos de persecución. Esto indicaría que dichos picaflores también consumen insectos.

Especies que fueron observadas, además de las descritas con anterioridad, con pruebas de nidificar en la zona (alimentando críos, aves con plumaje juvenil, comportamiento, etc.) son las siguientes: jilguero común, diuca, tagüita común, chincoles, chercán (cerca de habitaciones), tijerales comunes, fío-fío, cachudito y rayadito.

La mayoría de las especies ocupaban diversos tipos de habitats, pero es interesante nombrar aquellas que se observaron en Bosques de Pino introducido. Las aves observadas en 200 m. de recorrido cuidadoso en un bosque de este tipo, denso y con fines explotables fueron:

ESPECIE	ALTURA EN PINOS DESDE SUELO	N. EN 200m. DE RECORRIDO
Diucón Ecotonal	3-5 m	3 ind.
Fío-Fío	12-15 m	2-3 ind.
Aguiluchos comunes	15 m	Nidifica (3 ind)
Rayaditos	5-8 m	8 ind.
Comesebo grande	3-5 m	1 ind.
Jilguero común Ecotonal	12-15 m	17 ind.
Chercán Ecotonal	0-2 m	2 ind.
Chirigüe Ecotonal	2-4 m	2 ind.
Fringilo Ecotonal	3 m	1 ind.

Del total de las 49 especies, 9 (18%) fueron observadas asociadas a Bosque de Pino insigne. Especie ecotonal se define aquí, como presente en bordes del bosque de pino, en zonas de corta-fuegos (10 - 15 m. de ancho), caracterizados por presentar pasto verde y presencia de algunos arbustos, como mosqueto y otros, También se consideró ecotonal a bosques de pino quemados por incendio, con pasto en el suelo y abierto a penetración de rayos solares. En el último lugar es donde se observó a chirigües y al fringilo cordillerano.

Diucones, chercanes y jilgueros en cambio, se observaron en las franjas corta-fuegos. Estas especies estarían asociadas a bosques de pinos o lo visitarían temporalmente. En cambio fío-fío, rayaditos, comesebo grande (Aguilucho común aparentemente sólo nidificaba en pinos) son los únicos que fueron observados de por si en bosque de pino puro.

Pero su número es escaso, al ser comparado con los observados en áreas de vegetación natural y más abiertas. Interesante es destacar la observación de comesebo grande en esta zona y bosque de pino. En la zona central, esta especie es escasa y la localidad más nortina citada es Fundo Pajonal, cerca de Valparaíso (Rottmann, 1970).

Bibliografía :

Johnson, A.W.1965-67. The Birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru. vol. I yII.
Platt Establ. Gráficos, S.A. Argentina.

Rottmann, J. 197). Nota, Bol. Ornitol. 2 (1): 5

Presencia y reproducción de patos (ANSERIFORMES) en la Reserva Forestal Lago Peñuelas, Valparaíso, durante 1976.

Patricio Drouilly y
Juan C. Ibarra
Dpto. de Conservación
Corporación Nacional
Forestal.

La avifauna de la Reserva Forestal Lago Peñuelas ha sido inventariada a través de varios años por Rottmann (1971), Rottmann y Glade (1973). Ambos autores han registrado la presencia de 95 especies de aves para el lugar y han entregado además, antecedentes sobre nidificación y grado de endemismo de muchas de ellas, lo que en sí es una buena base para posteriores estudios que deseen emprenderse en este campo.

El presente trabajo es el resultado de algunas observaciones sistemáticas realizadas principalmente en las poblaciones de patos durante 1976, aprovechando tres visitas a la Reserva; la primera, en Abril, como parte de un censo otoñal de patos ejecutado por CONAF en la zona central del país (Drouilly, 1976); la segunda,en Agosto, junto a Alfonso Glade para cuantificar poblaciones invernales de patos; y la última, en Diciembre, en que los autores fueron comisionados para hacer un análisis de la avifauna con fines turísticos y de educación. Se incluyen además, algunas observaciones de interés sobre la presencia de otras aves en la Reserva.

RESULTADOS

I.- Poblaciones de patos.

El Lago Peñuelas es un importante habitat de patos, principalmente de las dos especies más comunes del país, el pato Jergón Grande (Anas georgica spinicauda) y el pato Real (Anas sibilatrix), especies que es posible de encontrar prácticamente durante todo el años en este lugar, aunque con fluctuaciones muy marcadas en su cantidad. Nuestras observaciones y censos absolutos realizados a través de todo el lago nos entregan los siguientes res ultados: (Tabla 1)

TABLA 1						
	19-IV-76		12-VIII-76		1-XII-76	
	N	%	N	%	N (x)	%
Pato Jergón Grande	1.900	72.4	458	18.3	1.515	57.0
Pato Jergón Chico	100	3.8	159	6.3	234	8.8
Pato Real	620	23.6	1.447	57.8	908	34.1
Pato Cuchara	4	0.2	118	4.7	2	0.07
Pato Rana	-		321	12.9	-	
	2.624		2.503		2.659	

(x) no se incluyen crías encontradas

El número total de patos, prescindiendo de las especies, ha sido muy similar durante otoño, invierno y primavera, no obstante que el lago, en 1976, ha ido disminuyendo ostensiblemente de nivel por causa de la sequía imperante; ya en Diciembre éste se encontraba entre los más bajos registrados en los últimos años.

Haciendo un análisis por especie podemos apreciar que el pato Jergón Grande fue la única especie que emigró durante el invierno, aunque algunos de ellos permanecieron en el lago. En cambio, el pato Real, pato Cuchara (Anas platalea) y el pato Rana (Oxyura sp.) registraron un notable aumento en los meses invernales para posteriormente, en primavera, emigrar hacia otros lugares y prácticamente desaparecer de Peñuelas como es el caso de las dos últimas especies. El pato Jergón Chico (Anas flavirostris flavirostris) ha ido, por su parte, aumentando gradualmente su población a través del año, aunque siempre permanece en cantidades bajas, Rottmann (1971) contabilizó 120 ejemplares en Julio de 1962. Durante este año no se detectó la presencia de otras especies anteriormente registradas, aunque en escaso número, como son el pato Negro (Netta peposaca), el pato Colorado (Anas cyanoptera) y el pato Rinconero (Heteronetta atricapilla).

II.- REPRODUCCION

Durante nuestra última visita, 1 y 2 de Diciembre, no encontramos patos nidificando, pero sí registramos abundantes parejas con crías de pato real y en menor escala de pato jergón chico y grande (Tabla 2), que deben haber empezado a nidificar en Octubre.

TABLA 2			
	N. parejas con crías	N. total de crías	Promedio de crías/pareja
Pato Real	41	408	9.9
Pato Jergón Grande	6	34	5.7
Pato Jergón Chico	2	8	4

La producción de patos reales para Peñuelas es bastante alta considerando aún la fuerte sequía imperante, sin embargo, estimamos que las esporádicas lluvias de Primavera, aumentaron las disponibilidades de alimento propiciando su reproducción. El alto promedio de crías por pareja en pato real, que va más allá de lo normal, es explicado por la tendencia que tienen muchas de ellas por apropiarse de polluelos ajenos de la misma especie (Rottmann, com.pers.), de tal modo que fue común encontrar parejas con 12 a 20 crías, incluso encontramos un grupo familiar formado por 6 adultos y 70 polluelos.

La escasa cantidad de crías, de pato jergón grande, encontradas no es posible atribuirla exclusivamente a una baja reproducción, puesto que generalmente estos patos se reproducen más temprano que el pato real, Agosto y Septiembre principalmente, y en la época de nuestra visita, los jóvenes de más de dos meses de edad pudieron pasar inadver-

tidos debido a que ya son capaces de volar y presentan un gran parecido con los adultos. En todo caso, el conteo de Agosto (Tabla 1) nos muestra que en ese mes la población de jergones grandes fue la más baja y no logramos, además, detectar nidadas.

III.- OBSERVACIONES GENERALES

A través de nuestras observaciones sobre la avifauna de la Reserva realizadas en estos últimos dos años, hemos podido registrar la presencia de tres nuevas especies, lo que hace elevar a 98 las especies conocidas para Peñuelas, más otros registros que son de interés por tratarse de aves poco comunes para el lugar.

1.- Cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus). Un ejemplar aislado fue observado el 22 de Abril de 1975 en la orilla norte del lago.

2.- Cuervo de pantano (Plegadis falcinellus chihi). Un ejemplar fue visto el 22 de Abril de 1975, en la ribera norte del lago junto a un grupo de gaviotas cahüil (Larus maculipennis).

3.- Pollito de mar rojizo (Phalaropus fulicarius). El 1 de Diciembre de 1976 vimos un ejemplar desplazándose por la orilla noreste del lago. Esta especie no había sido observada anteriormente en la Reserva.

4.- Chorlo de Campo (Oreopholus ruficollis). Un ejemplar fue observado en pastizales vecinos a la orilla este del lago, el 19 de Abril de 1976. Esta especie es registrada por primera vez en Peñuelas.

5.- Halcón perdiguero (Falco femoralis). Cuatro ejemplares fueron vistos en Abril de 1975, cazando pajarillos en pastizales vecinos a la orilla este del lago; posteriormente, el 2 de Abril de 1976 se observaron dos en el mismo lugar.

6.- Aguila (Buteo fuscescens australis). Dos ejemplares sobrevolando la Reserva fueron vistos el 2 de Diciembre de 1976.

7.- Carpintero chico (Dendrocopus lignarius). Un ejemplar fue visto en un tronco de quillay en la parte este de la Reserva el 2 de Diciembre de 1976.

8.- Mirlo argentino (Molothrus bonariensis). Una bandada integrada por 10 individuos, entre machos y hembras, fue observado en arbustos vecinos al estero, el día 2 de Diciembre de 1976. Esta especie no había sido observada anteriormente en la Reserva.

Referencias Bibliográficas

Drouilly, Patricio 1976 Censo otoñal de patos realizado entre el río Limarí y el río Maule, durante Marzo y Abril de 1976. Trabajo leído en Primer Symposium de Vida Silvestre, U. Austral, Valdivia. En prensa.

Rottmann, Jürgen 1971 Aves observadas en el Parque Nacional de Peñuelas. Boletín Ornitológico 3 (1): 2-6

Rottmann, J. y A.Glade 1973 Aves observadas en la Reserva de Peñuelas. Boletín Ornitológico 5 (1): 1-5

Anotaciones acerca de la gaviota migratoria Larus pipixcan WAGLER (Charadriif.: Laridae), en el Departamento de Arica.

Emilio Loo P.
Centro Investigación
y Capacitación Agrícola
Universidad del Norte
Coquimbo.

Durante la temporada de primavera-verano de los años 1973-1974, efectuamos algunas observaciones de campo de esta ave marina, de características continentales, cuyo nombre científico es Larus pipixcan.

Esta especie es residente en el hemisferio Norte de América, visitante regular y extraordinariamente abundante en los meses estivales desde el extremo norte del Perú hasta la altura de la Bahía de Arauco en Chile. Nuestras observaciones se circunscriben exclusivamente al Departamento de Arica, ubicado en el extremo norte de Chile.

La llegada de los primeros ejemplares la registramos el día 25 de Octubre de 1973, y ya el 6 de Noviembre la densidad era altísima, cuya cantidad la estimamos en más de 15.000 ejemplares, distribuídos tanto en la costa como en los valles de Azapa y Lluta. El regreso a su lugar de origen se inició en Mayo de 1974, y los últimos especímenes se fueron el 23 del mismo mes, lo que significa una permanencia de cinco meses.

Se ubican en todo el litoral de Arica, pero de preferencia en la desembocadura del río Lluta; valle del mismo nombre, donde lo hemos encontrado hasta la localidad de Molinos, 60 km. al interior del valle; y en el valle de Azapa, hasta la localidad de Casa Grande 40 km. al interior. En el valle de Camarones no ha sido observada.

Se les suele encontrar especialmente en campos de alfalfa y en terrenos que se están arando, hemos podido constatar que su alimentación es esencialmente a base de larvas de lepidópteros y adultos de algunas especies de insectos. Para poder comprobar esto, colectamos algunos especímenes y procedimos a realizar un análisis gástrico, cuyo resultado fue el siguiente:

Insectos:

Dermaptera: Ocasional (1)
Coleoptera: Relativamente abundante
Lepidoptera: Estado larvario: Muy abundante
Estado de crisálida: Abundante

Miriapoda:

Isopodos: Relativamente abundante

Artropodos no identificados : Presencia

Mamíferos:

Rodentia: 3
Total especímenes analizados: 14
Lugar de colecta: Valle de Lluta 3
Valle de Azapa 11

Del total de estómagos analizados se concluye que aproximadamente el 70% de su alimentación es a base de estados larvarios de lepidópteros y de crisálidas.

No hay página 10 en el original

ACERCA DE LA DISTRIBUCION ALTITUDINAL DE *Fulica armillata* Visillot

Javier González Z.
Museo Nac. de Hist. Natural

Respecto a la distribución de *F. armillata*, Goodall et al. (1951) han dicho que esta tagua se encuentra por las lagunas y ríos de todo el país, más no sube a la cordillera, siendo reemplazada en esos parajes por la tagua chica *F. leucoptera* Vieillot. Sin embargo, Rafael Barros (1929) agrega esta especie a la lista dada anteriormente en su trabajo "Aves de la Cordillera de Aconcagua" (1921) y añade: ... "Esta es la especie que se halla durante parte de la primavera y el verano, en las lagunas de la alta cordillera. La he encontrado repetidas veces y en número más que regular, en las del Cajón de Castro, a más de 3.000 metros de altura... Obtuve un macho el 5 de Marzo de 1925, en una laguna del Cajón de los Angeles, no lejos de los orígenes del estero Riecillos. En otoño, emigra abandonando esas alturas."

El mismo autor la señala además para la Laguna del Maule (1949), lo cual es corroborado también por Drouilly y Montecinos (1975) al citarla en la avifauna de esta laguna.

Referente a esta misma especie, Goodall et al. (1951) dan una descripción errónea acerca de los colores del escudete frontal:..."Escudo frontal ovalado y de color rojo bordeado de amarillo...", aún cuando en la figura de la lámina N. 26 (:177) la representan con el escudete amarillo, color que se ajusta a la realidad.

Referencias bibliográficas

Barros, R.	1921	Aves de la Cordillera de Aconcagua. Rev. Chil. Hist. Nat. 25: 167-192
id.	1929	Nuevas observaciones sobre aves de la Cordillera de Aconcagua. Rev. Chil. Hist. Nat. 33:355-364
id.	1949	Aves observadas en la excursión a la Laguna del Maule. Rev. Universitaria 34 (1): 71-81
Drouilly, P. y R. Montecinos	1975	Avifauna en la Laguna del Maule. MAULE UC 2 (1): 41-43
Goodall, J., A.W.Johnson y R.A. Philippi	1951	Las Aves de Chile, su conocimiento y sus costumbres. II: 177-178. Plat Establ.Grafs. Bs.As.

PATO GARGANTILLO EN VALDIVIA

El día 16 de Febrero el Sr. Osvaldo Doering observó la captura de varios patos por cazadores ilegales en las cercanía de la ciudad de Valdivia. A uno de los patos ante la insistencia del Sr. Doering, se le pudo cortar la cabeza con fines artísticos (crear moldes de yeso).

Al describir el pato pudimos constatar que se trataba de un vistiante ocasional al país, Anas bahamensis rubrirostris. Este hallazgo sería el primero para la región de Valdivia y tan al sur en el país, pues Goodall, J.D.; A.W. Johnson y R.A. Philippi. 1951. Las Aves de Chile, su conocimiento y sus costumbres. Tomo II: 142 citan haberlo observado sólo desde Arica a Bío-Bío. Osvaldo Doering, Roberto P. Schlatter.

AMPLIACION DE DISTRIBUCION LONGITUDINAL DE BAILARIN Y HALLAZGO DE TAGUA DE FRENTE ROJA EN VALDIVIA

En diversas expediciones a la Provincia de Llanquihue, se han observado a orillas de la Panamericana a Bailarines, Elanus leucurus, incluso hasta el límite de las provincias de Llanquihue y Osorno. Goodall, J.D.; A.W.Johnson y R.A. Philippi. 1951. Las Aves de Chile, su conocimiento y costumbres. Tomo II: 49, dan un rango de distribución para esta especie desde Atacama a Valdivia. Con estas observaciones en terreno la distribución del Bailarín se prolonga incluyendo la provincia de Osorno.

Durante prospecciones de ríos y vegas en los alrededores de la ciudad de Valdivia se ha identificado a Fulica rufifrons, Tagua de frente roja, abundante e incluso con polluelos ya crecidos en los alrededores de Febrero de 1975. Este antecedente amplía la distribución reproductiva de esta especie de Tagua desde Atacama a Valdivia (véase Goodall, Johnson y Philippi, op.cit.: 180). La distribución conocida para esta especie es desde Copiapó hasta Chepu, Chiloé. (Philippi,R.A. 1964. Catálogo de las Aves Chilenas, con su distribución geográfica, Inv. Zool. Chil. XI: 64). Roberto Schlatter.

Comentario Bibliográficos

Johnson, A.W. y colaboradores. 1972. Supplement to the Birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru. Platt Establ.Graf.Bs.As. 116 pp.

El Sr. Alfredo Johnson ha contribuído nuevamente con su particular dedicación a complementar y actualizar el conocimiento de la avifauna chilena. Sin embargo, se presentan varios "peros" a esta colaboración difusiva y científica nacional. La más grave es que la obra haya sido publicada nuevamente en inglés, al igual que los tomos anteriores de Johnson A.W. 1965 y 1967: Birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru. Con esto una gran proporción de naturalistas y público nacional siguen en la desesperación de no poder conseguir algo básico en su idioma, pues la excelente y clásica edición original en español (Goodall, Johnson y Philippi. 1946 y 1951 mas suplementos) ya está agotada.

En el suplemento se incluye la publicación de una nueva especie para Chile y la ciencia, el Comesebo de los Tamarugos, Conirostrum tamarugensis, sp.nov.Coerebidae, Passeriformes, y se incluyen las siguientes especies avistadas como nuevas en nuestro territorio y océano adyacente:

Fardela de Isla de Pascua, Puffinus nativitatis, Isla de Pascua (n)#
Fardela chica, Puffinus assimilis, Isla de Chiloé (v)&
Fardela capirotada, Puffinus gravis, Es trecho de magallanes (v)

Ave de Trópico (cola roja), Phaeton rubricauda, Isla de Pascua (n)
Ave de Trópico (cola blanca), Phaetor lepturus, Isla de Pascua (v)
Ave fregata, Fregata minor, Isla de Pascua (v)
Garza bueyera, Bulbucus ibis, Antofagasta (v)
Garza azul, Florida caerulea, Arica (v)
Gaviota de Sabine, Xema sabini, Talcahuano (v)
Gaviota de Galapagos, Creagrus furcatus, Chañaral (v)
Vencejo de Chimenea, Chaetura pelagica, Arica y otros (v)
Bandurria de las piedras, Upucerthia andecola, Antofagasta (v)
Papamosca de cola corta, Muscigralla brevicauda, Arica (v)
Golondrina barrenquera, Riparia riparia, Of.P.de Valdivia y Llifén (v)
Boblink,Dolichonyx oryzivorus, Of.P.de Valdivia (v)
Summer Tanager, Piranga rubra, Portezuelo del Carmen (v)
Fringilo semillero plebeyo, Catamenia inornata, Termas Mamiña (v)
Picaflor de Cora, Thaumastura cora, Arica (v)
Cuclillo de Pico negro, Coccyzus melacoryphus, Arica (v)
Fringilo platero peruano, Phrygilus alaudinus bipartitus, Arica (v)
Petrel gigante, Macronectes halli, mar afuera (v). Esta última especie no es considerada por el suscrito como especie separada, tampoco lo es por otros ornitólogos. Su status está aún muy en duda como especie.

#= nidifica
&= visitante

Extrañamente no se cita a Pachyptila turtur (Kuhl), al parecer no se consultó a Philippi, R.A. 1967. Bol.MNGN 29(6); 121-24.

Las otras especies de aves a continuación(pp.27 a 39) no han sido observadas aún en Chile, pero el autor presupone que "serían" observadas en nuestro país. En este sentido el autor no continuó con el sistema publicado en los libros anteriores de indicar aquéllas posibles especies con el s gno. Especies que no han sido vistas o cazadas en nuestro país no deben ser incluídas como especies observadas en Chile, pues a algunas personas les puede traer confusión.

Se presenta a continuación las especies que ocurren en zonas adyacentes del sur del Perú en base a Hughes, R.A. 1970. Ibis 112(4): 229, observándose que 187 especies (76%) de las 242 listadas ocurren en Chile.

Enseguida, por cuarta vez se publica las Aves de Isla de Pascua. Previamente se presentó en: Johnson,A.W.,W.R.Millie y G.Moffet,1970. the Ibis 112(4):532; Millie,W.R.,A.W.Johnson y G.Moffet, 1969.Bol.Ornit.1 (1):1-3 y Millie,G.R. y A.W.Johnson.1970.Mot.Mens.MNHN XIV (164):6-10.

Se agrega nueva información sobre la Gaviota garuma (Larus modestus) aportadas por Dr.Howell y sobre nuestro Pato Corta-corrientes en base a artículos de G.Moffet.

El trabajo continúa con datos sobre hallazgos de nuevas nidificaciones de distintas especies en Chile y una lista muy útil sobre extensiones distributivas de Aves chilenas (a lo largo y ancho del país). Además se presenta en forma novedosa una lista incompleta de las recuperaciones de aves anilladas en nuestro territorio y finalmente otras nuevas informaciones de interés.

En muchos casos se produce redundancia de información entre capítulos, llevando a confusión al lector. Tal es el caso del Capítulo II, con el III,V y VIII, en relación a Procellariiformes.

El trabajo adolece de otro error, y es el de no citar en muchos casos literatura como corresponde científicamente. Es el caso de los flamencos observados en Agosto de 1972 en el Salar de Surire (pp.91-92) que fueron observadas por Dr.Robert W.Mcfarlane. Desalienta aún más el constatar que no se cita en ningún lugar artículos del Boletín Ornitológico, actualmente el órgano oficial de la ornitología profesional y amateur de nuestro país. Esto se contrapone al entusiasta apoyo del Sr. Johnson en los inicios de nuestra sencilla revista. En cambio, sí que se citan manuscritos de autores extranjeros.

En resumen, la obra constituye en complementar información de aves nuestras y de regiones adyacentes, agregando datos sobre anillado, autoecología de algunas especies y otros. Pero la obra adolece de problemas como relativo desorden en su presentación y secuencia, la cita no apropiada de datos y por estar publicada en inglés.

Esperamos que la próxima versión de las aves de Chile, cualesquiera que sean sus autores se publique en español. Roberto P. Schlatter.