boletín ornitológico

PUBLICADO POR EL COMITÉ DE CIENCIA DEL INSTITUTO CHILENO-NORTEAMERICANO DE CULTURA
CASILLA 9286 - MONEDA 1467 - TELÉFONO: 63215, ANEXO 36
SANTIAGO, CHILE

AÑO IV - N°1 Octubre, 1972

AVES OBSERVADAS EN LA PROVINCIA DE TARAPACA, INCLUYENDO EL HALLAZGO DE DOS ESPECIES Y UNA SUBESPECIE NUEVAS PARA CHILE.

Bryan J. Lavercombe
Christopher Hill

En un viaje realizado entre el 27 de Octubre y el 8 de Noviembre de 1971 tuvimos la oportunidad de visitar y realizar observaciones de aves en una serie de localidades del extremo norte de Chile. Estas fueron :Antofagasta, Mejillones, Iquique, Pica, Arica, Putre, Chapiquiña, Murmantañe, Chucuyo, Parinacota y Lagos Cotacotani y Chungará. En todas ellas se acumuló la observación de 100 especies en épocas en que probablemente todas se encontraban en período de reproducción, nidificación y posiblemente algunas ya en etapas de crianza.

Presentamos a continuación la lista de 100 especies que fueron positivamente identificadas y posteriormente constatadas por el Sr. A.W. Johnson.

1.- Pinguino del Norte (Peruvian Penguin), Speniscus humboldti. Un ejemplar observado en playa Antofagasta, otros avistados nadando cerca de Mejillones.
2.- Blanquillo del Norte (Silvery Grebe), Podiceps occipitalis Juninensis. Abundante en los lagos Cotacotani y Chungará.
3.- Petrel Gigante (Giant Petrel), Macronectes giganteus. Varios individuos contemplados en el mar corroñando cerca de botes en Mejillones.
4.- Petrel Plateado (Silver Gray Fulmar), Priocella antarctica.Dos individuos vistos en Bahía Mejillones.
5.- Petrel Moteado (Cape Pigeon), Daption capensis. Algunos ejemplares identificados en Bahía Mejillones.
6.- Fardela negra Común (Sooty Shearwater), Puffines griseus. Un individuo divisado en el mar de Bahía Mejillones.
7.- Golondrina del Mar (Wilson's Petrel), Oceanites oceanicus ssp. Observados en abundancia en Bahía Antofagasta y Mejillones, muy sumiso, llegando hasta las costas.
8.- Pelícano (Peruvian Pelican), Pelecanus thagus. Común en todas las costas recorridas.
9.- Piquero Común (Peruvian Gannet), Sula variegata . Común en todas las costas visitadas.
10.-Cormorán Guanay (Guanay Cormorant), Phalacrocorax bougainvilli. Común en todas las costas examinadas.

11.- Cormorán Negro (Black Cormorant), Phalacrocorax ol. olivaceus. Común a lo largo del trayecto costero. Ejemplares divisados también en lagos Cotacotani y Chungará.
12.- Huairavo Común (Night Heron), Nycticorax nycticorax ssp. Varios individuos identificados a lo largo de costas y playas rocosas.
13.- Flamenco Común (Chilean Flamingo), Phoenicopterus ruber chilensis. Cuatro ejemplares vistos en Lago Chungará.
14.- Parina Grande (Andean Flamingo), Phoenicoparrus andinus. Aproximadamente 12 ejemplares descubiertos en lago Chungará, cerca de 70 iguales en lago Parinacota.
15.- Parina Chica (James's Flamingo), Phoenicoparrus jamesi. Un individuo adulto identificado con seguridad en Lago Parinacota, dos ejemplares más eran probablemente inmaduros.
16.- Piuquén (Andean Goose), Chloephaga melanoptera. Una pareja de esta especie fue vista en las orillas del Lago Chungará, dos parejas más en Lago Parinacota.
17.- Pato Juarjual Cordillerano (Crested Duck), Lophonetta specularoides altícola. Abundante en el Río Lauca y lagos alto-andinos.
18.- Pato Jergón Chico Común (Speckled Teal), Anas fl. flavirostris. Abundante en el Río Lauca y lagos alto-andinos.
19.- Pato Rana de Pico Ancho (Peruvian Ruddy Duck), Oxyura jamaicensis ferruginea.
20.- Pato Capuchino Común (Silver Teal), Anas v. versicolor. Bastante común en Río Lauca y lagos alto-andinos . Los ejemplares eran grandes y de pico muy azul.
21.- Cóndor (Condor), Vultur Gryphus. Un individuo avistado en las cercanías costeras de Iquique.
22.- Gallinazo (Turkey Vulture), Cathartes aura jota. Abundante en caseríos costeros.
23.- Aguila (Chilean Eagle), Buteo fuscescens australis. Un individuos observado en Putre, otro identificado en Parinacota.
24.- Tiuque Cordillerano (Andean Caracara), Phalcoboenus albogularis megalopterus. Un ejemplar visto en Lago Parinacota.
25.- Cernícalo Común (American Kestrel), Falco sparverius ssp. Varios ejemplares divisados en el Valle Lluta.
26.- Tagua Gigante (Giant Coot), Fulica gigantea. Bastante abundante en Lagos Cotacotani y Chungará. Varios polluelos fueron distinguidos.
27.- Pilpilén Negro (Blackish Oyster-catcher), Haematopus ater. Varios individuos contemplados en Antofagasta, Iquique y costas rocosas de Arica.
28.- Queltegue De La Puna (Andean Lapwing), Ptiloscelys resplendens. Una pareja observada en Putre y varios individuos en cercanías de los lagos alto-andinos.
29.- Chorlo de la Puna (Puna Plover), Charadrius alticola. Varios ejemplares avistados en las orillas de los Lagos Chungará y Parinacota.
30.- Chorlo Dorado (Golden Plover), Pluvialis d. dominicus. Un individuos identificado en playas de Arica.
31-. Chorlo Nevado (Snowy Plover), Charadrius alexandrinus occidentalis. Varios ejemplares vistos en playas de Antofagasta, Iquique y Arica.
32.- Playero de Baird (Baird's Sandpiper), Erolia bairdii. Individuos contemplados en Antofagasta y aproximadamente 10 en Lagos Cotacotani y Chungará .
33.- Playero Común (Sanderling), Crocethia alba. Grandes bandadas observadas en Antofagasta e Iquique.
34.- Pitotoi Chico (Lesser Yellowlegs) Tringa flavipes. Un ejemplar divisado en Lago Parinacota.

35.- Playero Manchado (Spotted Sandpiper) , Actitis macularia. Varios individuos identificados en costas rocosas de Arica.
36.- Playero Pectoral (Pectoral Sandpiper), Erolia melanotus. Dos ejemplares descubierto cerca del Lago Chungará.
37.- Chorlo Vuelve-piedras (Red Turnstone), Arenaria interpres morinella. Varios individuos vistos en costas de Antofagasta , Iquique y Arica.
38.- Zarapito Común (Whimbrel or Hudsonian Curlew), Numenius phaeopus hudsonicus. Común en todas las costas de nuestro trayecto.
39.- Chorlo de rompientes (Surf-birds), Aphriza virgata. Pequeño grupo de seis individuos observados en Iquique.
40.- Caití (Andean avocet), Recurvirostra andina. Común a lo largo de orillas en lagos alto-andinos.
41.- Pollito de Mar Rojizo (Red Phalarope), Phalaropus fulicularis. Grandes bandadas avistadas en el mar de Iquique y Arica.
42.- Perdicita Cojón Común (D'Orbigny's Seed-snipe), Thinocorus orbignianus ssp.Pequeños grupos identificados en terrenos salados cerca de Lago Parinacota.
43.- Gaviota Garuma (Grey Gull) , Larus modestus. Abundante en todas las costas recorridas.
44.- Gaviota Andina (Andean Gull), Larus serranus. Observada con plumaje reproductivo en todos los lagos alto-andinos.
45.- Gaviota Peruana (Band-Tailed Gull), Larus belcheri. Ejemplares inmaduros divisados a lo largo de las costas examinadas.
46.- Gaviota Dominicana (Kelp Gull), Larus dominicanus. Abundante en las costas de nuestro itinerario.
47.- Gaviota de Franklin (Franklin's Gull), Larus pipixcan. Algunos individuos contemplados en Antofagasta y Arica.
48.- Gaviotín Sud-americano (Southamerican Tern), Sterna hirundinacea. Abundante en Antofagasta y Mejillones.
49.- Gaviotín Chico (Peruvian Tern),Sterna lorata. Algunos individuos avistados en Mejillones y Arica.
50.- Gaviotín Monja (Inca Tern), Larosterna inca. Algunos ejemplares vistos en Mejillones.
51.- Gaviotín Elegante (Elegant Tern), Thalasseus elegans. Bastante abundante en Antofagasta y Mejillones.
52.- Rayador (Black Skimmer), Rynchops nigra cinerascens. Dos individuos observados en Antofagasta y una bandada de aproximadamente 150 en vuelo al sur de Arica.
53.- Paloma de Alas Blancas (Peruvian White-winged Dove), Zenaida asiatica meloda. Paloma más común en Valles de Pica , Azapa y Lluta.
54.- Tórtola común (Eared Dove), Zenaidura auriculata ssp.Común en Antofagasta y Arica.
55.- Tórtola Cordillerana (Black-winged Ground-dove), Metropelia m. melanoptera. Bastante común en Pica y valles de Arica.
56.- Tortolita Boliviana (Bolivian Bare-faced Ground-dove), Metropelia ceciliae gymnops. Algunos ejemplares identificados en Putre y Chapiquiña.
57.- Tortolita Quiguagua (Croacking Ground-dove), Eupelia cruziana.Común en Pica y valles de Arica.
58.- Picaflor Gigante (Giant Humming-bird), Patagona gigas.Un individuo descubierto en Murmantañe.
59.- Picaflor del Norte (Oasis Humming-bird), Rhodopis vesper ssp.Ejemplares observados en Pica, Arica y valles de Azapa y Lluta.
60.- Picaflor Chico de Arica (Chilean Woodstar), Eulidia yarrelii. Pocos ejemplares observados en valle de Azapa.

61.- Picaflor Cordillerano del Norte (Andean Hillstar), Oreotrochilus estella. Abundante en Putre y Chapiquiña.
62.- Pequén (Burrowing Owl), Speotyto cunicularia ssp. Dos parejas avistadas cerca de una playa de Arica.
63.- Pitigue del Norte (Andean Flicker), Colaptes rupicola ssp. Una pareja identificada cerca de Chucuyo, altiplano.
64.- Bandurrilla Cordillerana del Norte (Buff-breasted Earth Creeper), Upucerthia vallidirostris pallida. Común en alturas medias de los Andes, en Putre y Murmantañe.
65.- Matacaballo (Groove-billed Ani), Crotophaga sulcirostris. Aproximadamente 6 individuos contemplados en las partes más altas del valle Azapa, entre densos arbustos.
66.- Minero de la Puna (Puna Miner), Geositta punensis. Obsevado en los alrededores de habitaciones en Parinacota y en pendientes irrigadas en Putre.
67.- Churrete Costero (Seaside Cinclodes), Cinclodes n-f. nigro-fumosus. Una pareja vista en una saliente rocosa de Arica.
68.- Churrete Acanelado (Bar-winged Cinclodes), Cinclodes f. fuscus. Un individuo observado en Putre.
69.- Churrete de Alas Blancas (White-winged Cinclodes), Cinclodes a. atacamensis. Varios ejemplares divisados en cercanías de lagos alto-andinos y en Putre y Murmantañe.
70.- Tijeral Listado (Steaked Tit-spine-tail), Leptasthenura st. striata. Bastante común en áreas cerca de Chapiquiña.
71.- Canastero Cordillerano (Cordilleran Canastero), Asthenes modesta ssp. Ejemplares con plumaje no obscuro observados en Putre.
72.- Canastero Grande del Norte (Creamy Breasted Canastero), Asthenes d'orbigny arequipae. Reconocido por su canto en Putre y Murmantañe.
73.- Dormilona de Nuca Rojiza (Rufous-naped Ground-tyrant), Muscisaxicola rufivertex ssp.Una pareja identificada en Putre y otros a mayor altitud en el Altiplano.
74.- Dormilona de Nuca Castaña del Norte (Puna Ground-tyrant), Muscisaxicola juninensis. Común en las cercanías del Lago Parinacota.
75.- Pitajo Rojizo (D'Orbigny's Chat-tyrant), Ochthoeca o. oenanthoides. Un ejemplar visto en Putre en los alrededores de la iglesia local.
76.- Pitajo Gris (White-browed Chat-tyrant), Ochtoeca leucophrys leucometopa. Varios individuos divisados en campos irrigados en Putre y Murmantañe.
77.- Colegial Común (Rufous-backed Megrito), Lessonia r. rufa. Bastante común en los márgenes de los Lagos alto-andinos.
78.- Cachudito del Norte (Yellow-billed Tit-tyrant), Anaeretes flavirostris. Bastante común en los alrededores de Murmantañe (11.000 pies de altura).
79.- Cachudito de Cresta Blanca (Pied-crested Tit-tyrant), Anaeretes r. reguloides. Un individuos contemplado en el valle Lluta.
80.- Golondrina de Rabadilla Negra (Blue and White-Swallow), Notiochelidon cyanoleuca patagonica. Abundante en la mayoría de las localidades visitadas.
81.- Chercan Común (House Wren), Troglodytes aedon ssp. Observado en el valle de Lluta.
82.- Zorzal del Norte (Chiguanco Trush), Turdus chiguanco ssp.Varios ejemplares observados en Putre y Murmantañe.
83.- Fío-Fío (White crested Elaenia), Elaenia albiceps ssp. Varios individuos registrados en cercanías de Arica.
84.- Loica Chilena (Red-breasted Meadow Lark), Pezites m. militaris. Abundante en Arica, especilamente en el valle de Lluta.

85.- Gorrión (House Sparrow), Passer d. domesticus. Abundante en Pica, Antofagasta e Iquique. Menos cantidad fue divisada en Arica.
86.- Fringilo Negrillo (Blue-backed Grassquit), Volatinia jacarina peruviensis. Un ejemplar registrado a la entrada del valle Lluta.
87.- Fringilo Corbatita (Chestnut-throated Seed-eater), Sporophila telasco. Abundante en valles de Arica.
88.- Jilguero Peruano (Hooded Siskin), Spinus magellanicus urumbambensis. Pequeños grupos avistados en Putre.
89.- Jilguero Negro (Black Siskin), Spinus atratus. Varios individuos identificados en cercanías de los lagos altoandinos.
90.- Chirigue Verdoso (Greenish Yellowfinch), Sicalis olivascens cloris. Varios grupos avistados en los alrededores de Putre y Murmantañe.
91.- Fringilo Cordillerano del Norte (Black-hesded Sierra-finch), Phrygilus (gayi) atriceps. Algunos ejemplares observados cerca de Putre y Murmantañe.
92.- Fringilo Yal (Mourning Sierra-finch), Phrygilus f. fruticeti. Abundante en toda la región andina visitada.
93.- Fringilo de Espalda Castaña (Red- backed Sierra-finch), Phrygilus dorsalis. Dos casos aislados observados en dos ocasiones cerca de Lago Cotacotani.
94.- Fringilo Plomo (Plumbeous Sierra-finch), Phrygilus u. unicolor. Unos pocos ejemplares observados en los alrededores de los lagos alto-andinos.
95.- Chincol Común (Rufous-collared Sparrow), Zonotrichia capensis chilensis. Abundante en todas las localidades visitadas, incluyendo los altos andes.
96.- Comesebo Chico (Western Cinereus Conebill), Conirostrum cinereum littorale. Abundante en las partes bajas de los valles ariqueños.
97.- Fringilo apizarrado (Slender -billed Finch), Xenospingus concolor. Común en valles de Arica.

NUEVAS ESPECIES PARA CHILE.

98.- Picaflor de Cora (Peruvian Speartail),Thaumastura cora. Dos individuos descubiertos en los alrededores del Motel Azapa, Arica.
99.- Pequeña Garza Azul (Little Blue Heron), Florida caerulea. Un ejemplar observado en la saliente rocosa cerca del Morro de Arica.

NUEVA SUBESPECIE PARA CHILE.

100.-Fringilo Platero Peruano (Band-tailed Sierra-finch), Phrygilus alaudinus bipartitus. Un ejemplar divisado en Putre.

AUSENCIAS NOTABLES.

Durante todo el trayecto de visitas no se observaron especies del Orden Tinamiformes (Perdices sudamericanas) y Rheiformes (Avestruces sudamericanas) que habitan esas regiones nortinas.

OBSERVACIONES EN DETALLE DE ALGUNAS ESPECIES.

FLAMENCOS.-
El número total de flamencos observados en diferentes lagos altiplánicos durante los días 4 y 5 de Noviembre de 1971 fueron:
LAGO CHUNGARA: 20 ejemplares, de éstos, 6 correspondieron a la especie Phoenicopterus ruber y 10 a Phoenicoparrus andinus. El resto eran individuos inmaduros no identificados.
LAGO PARINACOTA: 80 ejemplares: entre éstos, 1 individuo era de la especie Phoenicoparrus jamesi y el resto adultos de Phoenicoparrus andinus, más inmaduros y ejemplares no identificados.
LAGO COTACOTANI: No se observaron flamencos de ninguna especie. Algunas características para la identificación a distancia de las distintas especies de flamencos:
Phoenicoparrus andinus: Los ejemplares adultos se caracterizan por una mancha negra en las alas plegadas y por las patas amarillas.
Ph. jamesi: Adultos son de bastante menor tamaño que la especie anterior y carecen de la mancha negra en las alas. Las patas son obscuras. Al aproximarnos a la población mixta de flamencos, la totalidad de los ejemplares de Ph. andinus escaparon. El adulto de Phoenicoparrus jamesi, mas dos posibles ejemplares inmaduros, en cambio se mantuvieron a cierta distancia de nosotros sin tomar vuelo. Pudimos acercarnos a éstos hasta aproximadamente 100 mts.(arrastrándonos en manos y rodillas). A esa distancia tuvimos una excelente visión de las secciones amarillas del pico y del tono bermellón de las patas. Durante los días de observaciones no se constató actividad de nidificación para ninguna de las especies presentes.

PICAFLOR DE CORA.- (Peruvian Sheartail), Thaumastura cora.
Dos ejemplares de esta especie, ambos con colas largas (por lo tanto de sexo masculino) fueron observados desde el 6 al 8 de Noviembre de 1971 en los alrededores del Motel de Azapa, Arica.
Descripción: Pequeños y con cuerpo de tamaño intermedio entre otras 2 especies presentes en esa localidad (Picaflor del Norte y Picaflor Chico de Arica). El pico era de longitud media, algo curvado hacia abajo y mucho más corto al ser comparado con el de Picaflor del Norte. La parte superior del cuerpo tenía tono verde obscuro, extendiéndose éste en forma gradual hasta los flancos que eran claros. El vientre en general era blanquecino y la garganta presentaba una mancha colorada e irisdiscente, que era visualizada solo en ciertas posiciones del ave. La cola muy típica era de una longitud una vez y media a la del cuerpo, uniformemente delgada (será que posee solamente 1 a 3 rectrices?), lateralmente de color negro y vista de atrás parecía ser más clara en la parte media. Las rectrices poseían una concavidad superior (más pronunciada en uno de los individuos) como se puede percibir en el esquema adjunto.
Etología: Ambos picaflores se alimentaban, en un gran arbusto ornamental que no fue identificado, pero que presentaba flores del tipo Compositae. Este arbusto estaba localizado detrás de nuestra habitación en el Motel en que hospedábamos. Los ejemplares realizaban frecuentes visitas a tal arbusto desde dos árboles cercanos. Las visitas con fines alimentarios duraban sólo de 20 a 40 segundos generalmente, separadas éstas por períodos de descanso de algunos minutos en sus perchas favoritas.

Este comportamiento alimentario se prolongaba hasta una hora durante observaciones hechas en la mañana y avanzada tarde. En esos períodos los picaflores fueron observados visitando solamente el arbusto mencionado anteriormente.

FRINGILIO PLATERO PERUANO.- (Band-tailed Sierra finch) Phrygilus alaudinus bibartitus.
Un ejemplar que debe pertenecer a esta especie fue observada por B.J. Lavercombe el día 4 de Diciembre de 1971 en terrenos cultivados cercanos al pueblo de Putre. El ave aperchaba en un cerco de arbustos y fue avistado rápidamente antes de emprender vuelo. El pico y patas eran visiblemente amarillos. Al sobrevolarnos se percibió su vientre blanco. Esta ave fue inicialmente identificada como Fringilio Platero (Phrygilus alaudinus alaudinus) pero por la distrubución conocida de este último no alcanza la latitud visitada. En un principio incluso presumimos que pudiere ser un Fringilio Semillero Argentino(Catamenia analis). Sim embargo la apariencia general del ejemplar correspondía a la de un platero.

PICAFLOR GIGANTE.- (Giant Humming-bird) Patagona gigas.
El 5 de Diciembre de 1971 observamos en Murmantañe un Picaflor Gigante, de tamaño similar al de la especie Patagona gigas visto en las planicies de la Zona central, pero de plumaje muy diferente. El ejemplar fue observado durante 10 minutos alimentándose en pequeños arbustos de una pendiente montañosa cerca del río en esa localidad. Resaltaba el tono naranja brillante en sus caras, garganta y partes ventrales. No presentaba estrías en el pecho. La cola era ventralmente blanquecina y el dorso de un tono café con una banda blanca. El ave era del tamaño de un Picaflor gigante pero el plumaje era confuso. La descripción para la subespecie peruana (Patagona gigas peruviana) de "poseer ventralmente un tono ocre obscuro" (Johnson, A.W. 1967 Birds of Chile, Vol. II, pp. 116) es inadecuada para este caso. Además, no existían estrías negras en la garganta. Podría tratarse de un ejmplar con plumaje caprichoso (polimórfico) o una nueva subespecie?

PEQUEÑA GARZA AZUL.- (Little Blue Heron), Florida caerulea.
Un ejemplar de esta especie fue avistada por C. Hill en Octubre 30 y 31 y por ambos autores el 5 y 6 de Noviembre de 1971. En todas las ocasiones fue observada en la costa rocosa del molo artificial, situado opuesto al Morro de Arica y entre el puerto y el balneario "La Lisera".
Descripción: El ave observada sin lugar a dudas era una garza, en vuelo y descanso. Durante el vuelo el cuello se encontraba encogido y la cabeza parecía estar entre las alas. Era de tamaño pequeño, posiblemente una o dos pulgadas más alta que la Garza chica. Poseía un contorno corporal esbelto y cuello notablemente delgado. Las plumas de la nuca se alargaban formando una cresta inconspicua. Excepto cabeza y cuello, el plumaje era de un tono gris-azulado obscuro y uniforme, incluyendo partes dorsales y ventrales de las alas. Cabeza y cuello eran más obscuro, casi negra. El pico era característico, de color gris-azulado claro y extremo negro. Patas eran obscuras.
Comportamiento: Ejemplar tímido, escapó tan pronto nos aproximamos. La cabeza metida bajo las alas, se mantenía inmóvil sobre una roca cerca de las rompientes.

OBSERVACIONES SOBRE AVES DE LA REGION DE DALCAHUE Y MOCOPULLI EN LA ISLA DE CHILOE.

Gerardo Barría P.
Facultad de Agronomía
Universidad de Chile
Santiago (Sur).

Durente dos meses, entre el 20 de Junio al 25 de Septiembre de 1958, efectuamos una colecta de aves en la región comprendida entre Mocopulli y Dalcahue en la Isla de Chiloé. Se prepararon 127 ejemplares con un total de 33 especies y se observaron además otras 12 especies, que no fue posible colectar.

La zona estudiada está ubicada entre los 100 y 150 mts. de altitud. Es una región de lomajes suaves cruzados por pequeños riachuelos y quebradillas que mantienen su torrente durante todo el año. Hay pequeñas extensiones de "Junquillares" (terrenos cubiertos por junquillos, Juncus sp.). También extensiones de turbales que durante el invierno por causa de las precipitaciones se mantienen cubiertas de agua, formándose pequeñas lagunas visitadas por algunas variedades de aves como por ejemplo Fam. Anatidae. Estos terrenos pantanosos dejan de serlo en verano, manteniéndose siempre una humedad relativa, que da origen a un típico ambiente húmedo frecuentado por avecillas, tales como la "Porotera" Gallinago paraguaiae magellanica, (King), el "Chercán de las Vegas" Cistothorus platensis hornensis (Lesson) etc.

Los bosques autóctonos han sido prácticamente arrasados, pero se mantienen aún en forma aislada, en especial en las laderas de las quebradas, donde se acumulan restos de antiguos quilantales, (Chusquea sp.). Estos lugares son visitados por algunas especies de aves.

El clima observado durante estos meses en general fue lluvioso y frío, a pesar que en Julio hubo una temporada con días de sol. Estos fríos culminaron con una nevada en el mes de Agosto que cubrió los campos con un manto de 5 cm. de espesor. Estas nevazones no son frecuentes en esta zona, pero en cambio las escarchas son comunes en los meses de Agosto y Septiembre. Desde principio de Agosto y fines de Septiembre, se observó el retorno de algunas especies de aves que invernan fuera de la isla y en regiones más templadas o menos lluviosas.

El objetivo principal de esta colecta fue la obtención de una buena serie de aves, para poder estudiar las posibles variedades propias de la Isla y obtener además datos delos meses de invierno, época en que nunca se habían estudiado las aves de la región. Esta colecta también tenía el interés de estudiar las aves que invernan en la isla y observar posibles especies migratorias de zonas más australes.

Em base a este material el Dr. R.A. Philippi y el Sr. Luis E. Peña G., describieron una nueva subespecie de Diuca. La determinación del resto de la colección fue efectuada por el Sr. Peña, en cuyo poder están las pieles estudiadas, con excepción del tipo de la citada nueva subespecie que se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago.

Damos a continuación una lista de las aves colectadas y observadas, anotándose el nombre vulgar con que se conoce en la zona.

CICONIIFORMES
ARDEIDAE:

1.- Nycticorax nycticorax obscurus, "Guauda"
El "Guairavo", es una especie relativamente común. No se capturaron ejemplares.

THRESKIORNITHIDAE:

2.- Theristicus caudatus melanopis, "Bandurria"
Se encuentran en bandadas en los potreros de la región. No se capturaron ejemplares.

ANSERIFORMES
ANATIDAE:

3.- Anas georgica spinicauda, "Pato barrero" o Jergón grande, ave muy abundante en las lagunitas. No se capturaron ejemplares.
4.- Anas sibilatrix, El "Pato overo" o Pato Real es muy abundante, observándose preferentemente en el litoral marino. Es muy esquivo. No se capturaron ejemplares.
5.- Anas flavirostris flavirostris, "Pato barrero" o Jergón chico. Se colectaron tres ejemplares machos en las pequeñas lagunas de la región. Este pato es muy abundante.

FALCONIFORMES
FALCONIDAE:

6.- Milvago chimango temucoensis, "Chiuque" o Tiuque.
Esta subespecie de Tiuque es abundante. No se colectaron ejemplares.
7.- Caracara plancus plancus, "Guarro" o Traro. Ave escasa en la región visitada. Sólo se observaron algunos ejemplares, sin proceder a su colecta.

GRUIFORMES
RALLIDAE:

8.- Ortygonax rytirhynchos landbecki, "Cututa".
El Piden, es bastante común. Se cazó una pareja.

CHARADRIIFORMES
CHARADRIDAE:

9.- Belanopterus chilensis chilensis, "Chel" o "Triel", "Treile".
El Queltehue, es muy común. No se cazaron ejemplares.

SCOLOPACIDAE:

10.-Gallinago paraguaiae magellanica, "Porotera".
La Becasina, bastante común en los pajonales. Difícil de cazar de día. Los cinco ejemplares fueron obtenidos de noche usando una linterna, 3 de ellos son machos y una hembra, el quinto no fue examinado. Al parecer la hembra es la que vuela al atardecer, estando los machos posados en el suelo.

PSITTACIFORMES
PSITTACIDAE:

11.-Micrositтace ferruginea minor, "Gatita"
Sólo fue observada a fines de Agosto. Se capturó sólo una hembra. Longitud 30cms.

STRIGIFORMES
TYTONIDAS:

12.- Tito alba tuidara , "Lechuza"
Se observaron ejemplares que no se pudieron cazar.

STRIGIDAE:

13.- Strix reufipes sanborni, "Cóo"
El Concon de Chiloé es un ave bastante escasa y difícil de cazar, debido a sus hábitos extrictamente nocturnos. Se escucharon varios ejemplares.

14.- Glaucidium brasilianum nanum, "Quiquí"
Se colectó un ejmplar del chuncho cuya longitud total alcanza a 15,5 cm. solamente.

CAPRIMULGIFORMES
CAPRIMULGIDAE:

15.- Caprimulgus longirostris bifasciatus, "Gallina ciega"
Frecuentemente se encuentra a esta avecilla posada en los caminos en el atardecer. No se capturaron ejemplares.

CORACIIFORMES
ALCEDINIDAE:

16.- Ceryle torquata stellata, "Martín Pescador"
Ave más bien escasa. Sólo se capturó un macho. Esta ave se encontró en el litoral marino, también se observó en los ríos mayores de la isla.

PICIFORMES
PICIDAE:

17.- Campephilus magellanicus, "Gallo del Monte"
"Carpintero". Bastante común en bosques. Existe la creencia de que estas aves pronostican el mal tiempo y esto depende de su grito. Se obtuvieron 3 ejemplares.

18.- Dendrocopos lignarius, "Pica Palos"
"Carpintero Chico". Especie escasa, se capturaron 2 hembras y un macho.

19.- Colaptes pitius pitius, "Pitío"
Ave muy común. Se colectaron 3 ejemplares 1 macho y 2 de sexo indeterminado.

PASSERIFORMES
FURNARIIDAE:

20.- Cinclodes patagonicus chilensis, "Piloto"
La Remolinera, es frecuente encontrarlo a orillas de los riachos. Se capturaron 3 hembras y 2 machos.

21.- Sylviorthorhynchus desmursii, "Memoriosa"
Esta especie de Colilarga es bastante común entre los matorrales. Se colectaron 3 machos y 2 hembras. Existe la creencia que obteniendo una pluma de la cola y colocándola dentro de un libro de estudio, la persona que lo hace logra mantener vivaz la memoria.

22.- Aphrastura spinicauda fulva, "Rayadillo"
El Rayadito de Chiloé, es bastante común . Se cazaron 2 hembras y 2 ejemplares a los cuales no se pudo determinar el sexo. Los habitantes de la región dicen que en verano llega otra especie de "Rayadito". Habrá que comprobar la vivacidad de esta afirmación. En caso afirmativo, podría significar que A. s. fulva es una especie distinta a A. s. spinicauda con la cual convive en verano.

23.-Leptasthenura aegithaloides aegithaloides, "Colilarga"
Es bastante común en toda la región, se cazaron 3 hembras y un ejemplar de sexo indeterminado.
24.-Pygarrhichas albogularis, "Carpintero Carmelita"
Esta avecita tan típica de los bosques vírgenes, es bastante rara en la zona. Se capturó una pareja.

RHINOCRYPTIDAE:
25.-Pteroptochos tarnii tarnii, "Huete-Huete"
El Hued-Hued, frecuenta los quilantales y lugares sombríos de la zona. Se cazaron 5 hembras y 2 machos.
26.-Scelorchilus rubecula rubecula, "Chucao"
Es bastante común. Frecuenta los mismos lugares de la especie anterior, se cazaron 5 hembras y 2 machos.
27.-Scytalopus magellanicus magellanicus, "Churrín" "Patrás"
Avecilla bastante rara y difícil de ubicar. Sólo se capturó una hembra. Habita entre los matorrales y en el bosque.
28.-Eugralla paradoxa, "El churrín de la Mocha"
Es muy escaso y difícil de ver. Habita en el monte y matorrales.Se colectó un ejemplar hembra.

TYRANNIDAE:
29.-Lessonia rufa rufa,
El Colegial fue observado en esta región sólo a principios de Septiembre. No se capturaron ejemplares.
30.-Pyrope pyrope fortis, "Ojos Colorados" o "Huelco"
El Diucón de Chiloé, es común durante todo el año. Es un ave considerada dañina por los apicultores, pues se alimenta entre otros insectos de abejas, Apis mellifica, frecuentando los lugares donde hay colmenares. Se capturaron 10 machos y 6 hembras. Los ejemplares midieron entre 20,8 y 22,7cm. de longitud total, con una media de 21,1 cm.
31.-Colorhamphus parvirostris, "Viudita"
Bastante escasa en la región estudiada. Sólo aparece en Primavera. Se pudieron colectar dos ejemplares machos.
32.-Anairetes parulus, "Cachudito"
Es una especie común, Se cazaron 3 hembras y 2 machos.

PHYTOTOMIDAE:
33.-Phytotoma rara, "Cae"
La Rara, es un ave bastante común. Se cazaron 2 hembras y 1 macho.

TROGLODYTIDAE:
34.-Troglodytes aedon chilensis, "Llique-llique"
Esta Chercán es muy común. Se prepararon 4 machos y una hembra.
35.-Cistothorus platensis hornensis,"El Chercán de las Vegas"
Es una avecilla escasa y poco frecuente en las colecciones. Se observaron algunos ejemplares. Se colectó un macho.

TURDIDAE:
36.-Turdus falklandii magellanicus, "Zorzal"
Es bastante común en la región estudiada, se colectaron 2 machos y una hembra.

MOTACILLIDAE:

37.-Anthus correndera chilensis, "Bailarín chico", "Caminante"
Relativamente escaso en la zona. Frecuenta lugares húmedos. Se colectó un macho.

ICTERIDAE:

38.-Molothrus bonariensis bonariensis, "Tordo Argentino"
El "Mirlo" se le encuentra en Primavera y por lo general en los potreros, cerca de los animales vacunos.
Esta ave está poco a poco invadiendo el territorio nacional. No se había reportado con anterioridad de la Isla de Chiloé. Se cazó un macho.

39.-Curaeus curaeus curaeus, "Tordo"
Ave muy común, se colectaron 2 hembras y cuatro ejemplares de sexo indeterminado.

40.-Pezites militaris militaris, "Pecho Colorado o Loica"
Es común. Se cazaron 5 machos y 2 hembras.

PLOCEIDAE:

41.-Passer domesticus, "Gorrión"
Ave poco frecuente en la zona sólo habita en el pueblo y no se observó en el campo. No se colectaron ejemplares de esta ave.

FRINGILLIDAE:

42.-Spinus barbatus, "Jilguero"
Es un ave bastante escasa durante el invierno, haciéndose más común a medida que avanza la primavera.
Se supone que emigra a comienzos de invierno hacia lugares de clima más favorable. Se cazaron y prepararon 6 machos y 4 hembras.

43.-Diuca diuca chiloensis, "Diuca de Chiloé"
Es un ave bastante común. Se capturaron 3 machos, 3 hembras y 2 ejemplares cuyo sexo no fue determinado.

44.-Phrygilus patagonicus, "Chanchito"
Se encuentra con frecuencia en las cercanías de las casas de la región.
Se colectaron 3 machos y 2 hembras.

45.-Zonotrichia capensis chilensis, "Chincol o Copete"
Esta avecilla típica de nuestra avifauna es muy común en la zona recorrida. Se capturó 1 macho y 3 hembras, una de las cuales presenta albinismo parcial.

NOTAS BREVES.

Hallazgo de una especie de ave visitante en Arica.

Durante observaciones hechas en el Valle de Azapa por el Sr. Rainer Greissl en el día 18 de Octubre , 1971, se constató la presencia de 6 ejemplares de la especie Burhinus superciliaris.
Tal especie fue identificada por Jürgen Rottman en base a fotografías enviadas por el Sr. Greissl. Esta especie se había cazado previamente en 1851, por el Sr. Froben en Arica (Goodall, J. D. et al, 1951 vol.II, pp 262) y este hallazgo sería el segundo conocido en Chile.
El nombre vulgar para esta ave en Perú es "Huerequeque". La descripción de una pareja de aves de esta especie realizada por el Sr. Greissl es la siguiente: Macho y hembra iguales, de 30 cm. de longitud. La cabeza posee 2 bandas longitudinales negras. Las partes superiores son gris-café con partes más obscuras. El iris del ojo sobresale en vistocidad, son grandes y de color amarillo-verdoso. El pico en la base es blanco y el resto de tonalidad gris-negro. Las patas son de color gris claro.

Editores.

COMITE DE REDACCION.

El comité de redacción del Boletín Ornitológico será presidido por el Dr. Roberto P. Schlatter, quién se integra a éste a partir del presente número. Forman parte del Comité de Redacción además los Sres. Jürgen Rottman y Patricio Drouilly.